

# Standaarddeisen


## Standaarddeisen

# Halsband parkieten

## Halsband parkieten

## deel 2

Rozeborstbaardparkiet  
Grote Alexander  
Rozekopparkiet  
Pruimkopparkiet  
Grijskopedelparkiet  
Layardparkiet  
Malakkaparkiet  
Derbyanparkiet  
Malabarparkiet of Duifparkiet



**Inhoudsopgave.**

|   |    |
|---|----|
| Voorwoord.....  | 3  |
| Het geslacht Edelparkieten,genus Psittacula.....                                      | 5  |
| Niet opgenomen soorten in deze standaard:.....  | 6  |
| Uitgestorven soorten: .....   | 6  |
| Standaard Edelparkieten .....   | 7  |
| 1.Veerstructuur van de Edelparkieten. ....  | 7  |
| 2: De mutaties bij de Edelparkieten. ....   | 7  |
| Toelichting benamingen:.....  | 10 |
| 3: De kleurvererving van de Edelparkieten mutaties. ....                              | 11 |
| 4. Standaard Edelparkieten .....  | 12 |
| Afrikaanse halsbandparkiet (Psittacula krameri parvirostris) Scopoli 1769 .....       | 12 |
| Man: Afrikaanse halsbandparkiet .....   | 13 |
| Roze borstbaard parkieten .....   | 15 |
| Man:.....   | 18 |
| Simeulue rozeborstbaard parkiet .....   | 18 |
| 36 cm .....   | 18 |
| Man:.....   | 19 |
| Man:.....   | 19 |
| Alexander parkieten (Psittacula eupatria ) Linne 1766 .....                           | 22 |
| Man: Grote Alexanderparkiet .....   | 24 |
| 58 cm .....   | 24 |
| Man:.....   | 25 |
| Rozekop parkiet - Grijskop edelparkiet –Pruimkop parkiet – Rothschild's parkiet:..... | 28 |
| Man: Rozekop parkiet.....   | 30 |
| 30 cm .....   | 30 |
| Pruimkop parkieten .....  | 32 |
| Man:.....   | 32 |
| 34 cm .....   | 32 |
| Malabar –en Layard's Parkiet .....  | 34 |
| Langstaart parkieten en de Derbyan parkiet.....                                       | 37 |
| Man: Malakka langstaart parkiet .....   | 38 |

## **Voorwoord.**

Vertegenwoordigers van het geslacht Edelparkieten behoren tot de langst bekende vogels in avicultuur. De Grote Alexander parkiet dankt zijn naam aan Alexander de Grote die enkele van deze vogels meebracht van zijn reizen naar Azië. Vandaag de dag behoren halsbandparkieten tot de bekendste en meest gekweekte parkietensoorten. In de afgelopen decennia zijn er diverse nieuwe mutaties ontstaan. Veel van deze mutaties zijn te combineren zodat het aantal kleurvariëaties bijna eindeloos lijkt. Veel van deze mutaties en combinaties hebben in liefhebberskringen allerlei soms fantasievolle benamingen gekregen.

In 2000 is er een werkgroep aangesteld, die als taak kreeg het opstellen van een standaard halsbandparkieten. Na het instellen daarvan heeft deze werkgroep contact gezocht met de binnen PS-Holland functionerende Werkgroep Edelparkieten, bestaande uit diverse bekende kwekers uit Nederland en België.. Deze groep heeft als doel het promoten van de Edelparkieten als volièrevogel en het verschaffen van informatie daarover. Beide werkgroepen hebben daarna contact gelegd met MUTAVI, een researchgroep die zich richt op de vederstructuur en de genetica van vogels. Belangrijke doelstelling van MUTAVI is het bereiken van een internationale, eenduidiger naamgeving van mutaties gebaseerd op vederonderzoek.

Alhoewel de drie genoemde groepen ieder hun eigen doelstelling hadden is constructief samengewerkt. De meeste tijd is gaan zitten in de naamgeving van de mutaties. Zoals hierboven gezegd werden in kwekerskringen verschillende fantasiebenamingen gebruikt. Het heeft veel tijd en overredingskracht gekost om op één lijn te komen. Uiteindelijk is dat gelukt en wij hopen dat op die manier een breed draagvlak is ontstaan voor de voorgestelde benamingen, mede door de verschillende publicaties van de werkgroep die in alle Nederlandstalige vogelbladen zijn verschenen. De gebruikte benamingen en genetische symbolen sluiten aan bij de internationale nomenclatuur. Om de overgang gemakkelijker te maken vindt u in deze standaard de juiste benaming en de oude benaming vermeld in de tabel met de voornaamste mutatiekenmerken. Wij hopen dat binnen korte tijd de juiste benamingen door iedereen gebruikt zullen worden. Het is even wennen maar recente naamsveranderingen zijn ook in korte ingeburgerd geraakt. Als positief voorbeeld hiervan verwijzen wij naar de verandering van isabel naar pallid bij de Agapornis roseicollis. De discussie hierover vond in dezelfde tijd plaats als de discussie binnen de werkgroep halsbandparkieten. Bij de Agaporniden is men er inmiddels al aan gewend dus bij de halsbandparkieten zal het ook wel meevallen.

De werkgroep heeft het concept van de standaard op 3 mei 2003 in Dinteloord gepresenteerd aan een groep van meer dan 70 kwekers en keurmeesters van bijna alle vogel- en parkietenorganisaties uit Nederland en België. Ook daar is positief gereageerd op de keuzes die gemaakt zijn.

Lang niet alle mutaties worden in grote aantallen gekweekt, sommigen zijn nog maar kort geleden ontstaan en andere zijn er al langer maar kweken zeer moeilijk. Er is derhalve een keuze gemaakt welke combinaties en mutaties beschreven moesten worden. Bij het algemener beschikbaar komen van die kleurslagen zullen aanvullingen op de standaard gemaakt dienen te worden.

De nu voorliggende standaard is het eerste deel van de standaard Edelparkieten en betreft de Indische halsbandparkieten als meest bekende vertegenwoordiger van het geslacht, waarvan ook de meeste mutaties bekend zijn. Echter bij de overige Edelparkieten zijn inmiddels ook verschillende mutaties ontstaan. Deze zullen in deel 2 worden behandeld naast een beschrijving van alle bekende soorten van het geslacht.

De samenstellers van deze standaard hopen een positieve bijdrage geleverd te hebben aan de ontwikkeling van de vogelsport. Zij zullen de vinger aan de pols houden en indien nodig aanvullingen op deze standaard verzorgen. De werkgroep bedankt de Werkgroep Edelparkieten van PS-Holland en MUTAVI voor de prettige samenwerking tot nu toe en wil graag gebruik maken van de daar aanwezige kennis om deel 2 van de standaard Edelparkieten te kunnen voltooien.

De TC parkieten van de A.N.B.v.V. bedanken dan ook de leden van de Werkgroep Halsbandparkieten. Ook de prettige samenwerking, met alle vogelorganisaties in Nederland en België die we beleefd hebben bij het tot stand komen van deze standaarddeis, nodigt uit tot verdere samenwerking met nieuwe nog uit te brengen gezamenlijke standaarddeisen.

Zutphen, zomer 2009

# Het geslacht *Edelparkieten*, genus *Psittacula*

## Algemene opmerkingen met betrekking tot het geslacht.

- 15 soorten met 20 ondersoorten, 2 uitgestorven, 1 soort zeer bedreigd met uitsterven en 1 twijfelachtige (onder)soort.
- formaten tussen 29 en 64 cm
- Strak bevederd, lange spits toelopende staart met 2 verlengde staartpennen
- Duidelijk geslachtsonderscheid, soms snavelkleur, soms tekening
- duidelijk verschil met jeugdkleed, na 1,5 – 2,5 jaar volledig op kleur
- Biotoop: bossen, velden, veel soorten zelfs in bewoonde plaatsen
- Holenbroeder
- Snelle vliegers, toch ook goede klauteraars
- Voeding: Zaden, granen en vruchten

## Binnen het geslacht van de Edelparkieten worden de volgende soorten en hun ondersoorten onderscheiden:

- **Grote Alexanderparkiet** *P.eupatria*  
*P.e.eupatria* Grote Alexanderparkiet  
*P.e.nipalensis* Nepalese Alexanderparkiet  
*P.e.magnirostris* Andamanen Alexanderparkiet  
*P.e.avensis* Birma Alexanderparkiet  
*P.e.siamensis* Laos Alexanderparkiet
- **Halsbandparkiet** *P.krameri*  
*P.k.krameri* Afrikaanse halsbandparkiet  
*P.k.parvirostris* Abessijnse halsbandparkiet  
*P.k.borealis* Neumann's halsbandparkiet  
*P.k.manillensis* Indische halsbandparkiet
- **Mauritiusparkiet** *P.echo*  
*P.echo* Mauritiusparkiet of Echo-parkiet
- **Grijskopedelparkiet** *P.himalayana*  
*P.h.himalayana* Himalaya zwartkopedelparkiet  
*P.h.finschii* Finsch zwartkopedelparkiet
- **Pruimekopparkiet** *P.cyanocephala*  
*P.cyanocephala*
- **Rozekopparkiet** *P.roseata*  
*P.r.roseata* Rozekopparkiet of Bloesomkopparkiet  
*P.r.juneae* Birma Rozekopparkiet
- **Rotschild's parkiet** *P.intermedia*  
*P.intermedia*
- **Duifparkiet** *P.columboides*  
*P.columboides* Duif- of Malabarparkiet
- **Layard parkiet** *P.calthorpa*  
*P.calthorpa* Layard parkiet of Emeraldnek-parkiet of Blauwstaartparkiet
- **Seychellen parkiet †** *P.wardi* †  
*P.wardi* Seychellen edelparkiet
- **Newton's parkiet †** *P.exsul* †  
*P.exsul* Newton's edelparkiet
- **Derbyan parkiet** *P.derbiana*

- |                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <i>P. derbiana</i>             | Derbyan of China-parkiet          |
| • <b>Rozeborstbaardparkiet</b> | <i>P. alexandri</i>               |
| <i>P.a.alexandri</i>           | Java rozeborstbaardparkiet        |
| <i>P.a.kangeanensis</i>        | Kangean rozeborstbaardparkiet     |
| <i>P.a.dammermanni</i>         | Dammerman's rozeborstbaardparkiet |
| <i>P.a.perionca</i>            | Nias rozeborstbaardparkiet        |
| <i>P.a.major</i>               | Babi rozeborstbaardparkiet        |
| <i>P.a.cala</i>                | Simeulue rozeborstbaardparkiet    |
| <i>P.a.abbotti</i>             | Abbott's rozeborstbaardparkiet    |
| <i>P.a.fasciata</i>            | Indische rozeborstbaardparkiet    |
| • <b>Blyth's parkiet</b>       | <i>P. caniceps</i>                |
| <i>P.caniceps</i>              | Blyth's of Nicobarenparkiet       |
| • <b>Langstaart parkiet</b>    | <i>P. longicauda</i>              |
| <i>P.l.longicauda</i>          | Langstaart- of Malakkaparkiet     |
| <i>P.l.defontainei</i>         | Natuna langstaartparkiet          |
| <i>P.l.modesta</i>             | Roodkop langstaartparkiet         |
| <i>P.l.tytleri</i>             | Andamen langstaartparkiet         |
| <i>P.l.nicobarica</i>          | Nicobaren langstaartparkiet       |

Bij meerdere soorten binnen dit geslacht zijn mutaties ontstaan. In dit deel van de standaard beschrijven we echter alleen de mutaties en de kleurslagen van de Indische Halsbandparkiet. Deze soort is het meest gekweekt en hiervan zijn ook de meeste kleurslagen bekend.

### Niet opgenomen soorten in deze standaard:

Er zijn vier soorten niet in deze standaard opgenomen, twee ervan omdat ze helaas zijn uitgestorven en twee omdat ze niet gehouden worden in Europa en er te weinig gegevens over bent zijn.

Wel geven we een korte omschrijving van deze soorten, indien U een van deze soorten tegen komt (de niet uitgestorven wel te verstaan) dan contact opnemen met Uw KMV en/of werkgroep edel parkieten

#### **Echo of Mauritius parkiet ( *Psittacula echo*) Newton & Newton 1876**

Deze zeer zeldzame soort komt voor op het eiland Mauritius. Lijkt erg veel op de Afrikaanse halsband parkiet is met zijn 42 cm iets forser en zijn wat donkerder van kleur. De zwarte halsband van de man is ook wat breder. De snavel van de man is donkerrood met een gele punt en de onder snavel zwart. De pop heeft een zwarte snavel een iets kortere staart en een geelgroene nekband.

#### **Blyth's parkiet ( *Psittacula caniceps*) Blyth 1846**

Over deze 56 grote Blyth's parkiet is nog zeer weinig bekend. Er zijn geen ondersoorten.

Verspreidingsgebied is Kondul, Groot Nicobar en Monschall van de Nicobar eilanden.

De kop is licht lila grijs, ze bezitten een brede baard, een zwarte voorhoofdsband en zijn verder overwegend groen van kleur. Poppen hebben een zwarte snavel mannen een rode boven en zwarte onder. Verder hebben poppen meer blauw in de kop en is de staart veel korter.

### Uitgestorven soorten:

#### **Newton's parkiet ( *Psittacula exsul*)**

Deze 40 cm grote edelparkiet is omstreeks 1875 uitgestorven. Uiterlijk waren dit zeegroen gekleurde halsband parkieten.

#### **Seychelles parkiet ( *Psittacula wardi*)**

Deze 41 cm grote edel parkiet is begin 20<sup>ste</sup> eeuw uitgestorven.

Een volwassen man had een zwarte band en het achterhoofd was blauw overgoten. Beide geslachten hadden een rode snavel en een roodbruine vleugelvlak.

Verdere gegevens zijn er niet bekend.

# Standaard Edelparkieten

Dit hoofdstuk is ingedeeld in de volgende paragrafen.

1. Veerstructuur.
2. Mutaties.
3. Kleurvererving.
4. Standaard van de Edelparkieten

## 1. Veerstructuur van de Edelparkieten.

Uit vederonderzoek is gebleken, dat zich in de bevedering de volgende kleurstoffen bevinden:

- a. zwart eumelanine
- b. geel psittacine
- c. rood psittacine

De baard van de veer is van het structurele type, dus bezit de zgn. blauwstructuur. Deze gecombineerd met het gele psittacine in de cortex geeft de baard haar groene kleur.

De haakjes zijn in een groot deel van de bevedering niet volledig gekleurd. Dit zorgt er voor dat de kleuren van de edelparkieten niet zo fel zijn als bij andere kromsnavels. De vogels tonen een lichte was in het grootste deel van de veervelden. De felste kleuren bevinden zich aan de kop, daar is de bevedering het meest intensief.

De kleur van de snavel en de oogring is bij alle tot heden bekende mutaties rood gebleven. Alleen de kleur van de ondersnavel, waar zich eumelanine bevindt, kan veranderen bij diverse mutaties. Dit geldt ook voor de oog- en pootkleur.

## 2: De mutaties bij de Edelparkieten.

### BLAUW

De blauwmutatie veroorzaakt een totale psittacine reductie in de cortex. Opvallend is dat de kleur van de snavel, evenals de kleur van de oogringen (washuid) rood blijft. Dat deze mutatie niet uitsluitend het gele psittacine reduceert blijkt uit de kleur van de nekband. Deze is wit in plaats van roze. De reductie beperkt zich dus tot de bevedering.

Vererving: autosomaal recessief,  
Symbool: *bl*

### TURQUOISE.

Deze mutatie zorgt voor een partiële psittacinereductie. Ideaal is wanneer deze reductie ongeveer 30 % is. In de praktijk blijkt dat de werking van deze mutatie ligt tussen de 10 en 90%, dit geeft een grote variatie in kleur. Een lastig punt bij deze kleurslag vormt de egaliteit, vooral op het rugdek. Bij halsbandparkieten werd deze mutatie pastelblauw genoemd. Deze mutant heeft echter niets met pastel te maken. Het is dezelfde mutant die bij andere kromsnavels zeegroen heet en bij grasparkieten geelmasker wordt genoemd. Vanwege het internationale karakter van de halsbandliefhebberij is hier gekozen voor turquoise, een naam die in meerdere talen bekend is. De mutatie vormt een meervoudige mutatiereeks met blauw, waarbij het psittacinebezit dominant is. De volgorde van dominantie in de vererving is dus: turquoise – blauw.

Vererving: autosomaal recessief.  
Symbool: *bl<sup>q</sup>*

### CINNAMON

Door een onvolledige oxydatie van het eumelanine wordt dit niet zwart maar blijft bruin van kleur. De kleur welke vervolgens ontstaat, is in grote mate afhankelijk van de concentratie melanine. De lichaamskleur wordt een nuance lichter van kleur en is bruin bewaasd. Op plaatsen waar een hoge

concentratie eumelanine aanwezig is, zoals in de keeltekening, wordt de kleur donkerbruin tot zwartbruin. De vogels worden geboren met rode ogen, welke na enkele dagen donkerder worden.  
Vererving: geslachtsgebonden recessief  
Symbool: *Xcin*

### **PALLID**

Deze mutatie veroorzaakt een kwantitatieve melaninereductie. De lichaamskleur wordt hierdoor een nuance lichter. De reductie vindt ook plaats in de ogen en de ondersnavel en poten. De kop is bij voorkeur zo licht mogelijk van kleur, zodat een zo groot mogelijk contrast ontstaat. Opvallend is dat de pennen bij de schacht het donkerst zijn en naar de rand toe lichter worden. Deze mutatie vormt een meervoudige mutatiereeks met *ino*. Deze mutatie wordt dan ook veelvuldig ingekweekt. Het resultaat is dat er veel vogels zijn met een te bleke lichaamskleur.  
Vererving: geslachtsgebonden recessief.  
Symbool: *Xino<sup>pd</sup>*.

### **FALLOW**

De fallowmutatie zorgt ervoor dat er geen pigmentafzetting is in de ogen en in de hoorndelen. De ogen zijn dus nu helder rood van kleur, de poten zijn vleeskleurig en de nagels hoornkleurig. De lichtere kleur van het eumelanine komt ook tot uiting in de kleur van de ondersnavel. Deze is niet meer zwart maar donkerrood. Tevens zijn de pigmentkorrels, die in de bevedering aanwezig zijn, kleiner van afmeting. Hierdoor is er meer reflectie van licht wat een lichaamskleur geeft die een nuance lichter is. Er is ook een onvolledige oxydatie van de eumelaninekorrels, waardoor deze bruin van kleur blijven. Net als bij een aantal andere parkietensoorten, zijn er ook bij de halsbandparkiet twee types fallow ontstaan: de (brons) fallow (de donkere vorm) en de bleekkopfallow (de lichte vorm, herkenbaar aan de rode ogen zonder iris).  
Vererving: autosomaal recessief  
Symbool: *bz* voor de (bronzefallow) en *cf* voor de bleekkopfallow (clearheadfallow).

### **DOMINANT GEZOOMD**

Een kwantitatieve melaninereductie, waarbij het ideaal een reductie van 50% is. De variatiebreedte is echter groot. De koptekening waar een hoge concentratie eumelanine aanwezig is, wordt wel lichter van kleur maar kan nog het best als zwart omschreven worden. De kleur van de pennen is typisch voor de pastelmutatie: licht bij de schacht, donkerder wordend naar de rand toe.  
Vererving: autosomaal dominant  
Symbool: *Ed*, van het Engelse Edged Dilute.

### **DONKERFACTOR**

Veroorzaakt een minder diepe bewolkte zone waardoor er meer absorptie van licht is. Hierdoor wordt de lichaamskleur donkerder. De diameter van de baarden wordt eveneens kleiner.  
Vererving: autosomaal onvolledig dominant  
Symbool: *D*

### **GRIJSFACTOR**

De grijsmutatie berust op een reorganisatie van de inwendige structuur van de baarden waarbij de sponszone en de medulla niet als zodanig meer herkenbaar zijn. Er vindt daardoor geen verstrooiing(interferentie) van blauw licht plaats. In de groen, turquoise, en blauwserie wordt de kleurslag resp. grijsgroen, turquoise grijs en grijs genoemd.  
Vererving: autosomaal dominant  
Symbool: *G*.

### **VIOLETFACOR**

Door een veranderde, veel fijnere structuur van de sponszone wordt door middel van interferentie violet licht in plaats van blauw licht teruggekaatst. De werking van deze mutatie komt het best tot uiting in combinatie met een donkerfactor. Met een enkele donkerfactor ontstaat de typische violetkleur. Bij een dubbele donkerfactor is er nagenoeg geen effect, de violetfactor is dan moeilijk zichtbaar. Bij vergelijking is de kleur een nuance donkerder dan zonder violetfactor.

Vererving: autosomaal onvolledig dominant

Symbool: *V*.

### **BLEEKSTAART**

Deze mutatie veroorzaakt een plaatselijke eumelaninereductie. Dit is het geval in de staart, de onderstaartdekveren en de onderbuik. Bij mannen vindt de reductie ook op de kop plaats. De melaninereductie is op deze plaatsen bij voorkeur maximaal. Dit opleken van de kleur gaat geleidelijk en het duurt drie jaar voordat de vogel volledig op kleur is. In de rest van de bevedering moet de kleur maximaal zijn om een zo groot mogelijk contrast te verkrijgen.

Vererving: autosomaal recessief

Symbool: *ct* (cleartail)

### **INO-FACTOR**

Een totale reductie van eumelanine in de gehele bevedering. Het psittacine (rood en geel) wordt niet beïnvloed.

Vererving: geslachtsgebonden recessief.

Symbool: *Xino*

### **RECESSIEF BONT**

Een zeer onregelmatig bontpatroon dat ontstaat door het plaatselijk ontbreken van pigmentcellen. Kenmerk is de afwezigheid van het geslachtsonderscheid. Bij deze mutant ontbreekt dus de koptekening bij de mannen.

Vererving: autosomaal recessief

Symbool: *s*

### **OPALINE**

Kwantitatieve reductie van het eumelanine op het rugdek, de borst en de buik. Typisch kenmerk is de blanke vleugelspiegel.

Vererving: geslachtsgebonden recessief.

Symbool: *Xop*

### **MISTY**

Kwantitatieve reductie van het eumelanine tot 75%.

Vererving: autosomaal dominant

Symbool: *Mt*.

### **OVERGOTEN**

Kwantitatieve reductie van het eumelanine tot 20%.

Vererving: autosomaal recessief

Symbool: *Dil*, van het Engelse Dilute.

## Toelichting benamingen:

In kwekerskringen werden soms allerlei fantasiebenamingen gebruikt op basis van bepaalde uiterlijke kenmerken van de halsbandparkieten. In deze standaard is er naar gestreefd om de juiste benamingen te geven aan mutaties op basis van vererving en vederstructuur. Deze termen zijn ook internationaal bekend en aanvaard.

Wij zijn er van overtuigd dat door het gebruik van de juiste namen er meer helderheid zal ontstaan. De internationale terminologie is voor een belangrijk deel gebaseerd op de Engelse taal. We kennen een groot deel van de Engelse termen al door de naamgeving bij andere vogelsoorten, o.a. grasparkieten. Wij verwachten dan ook dat de kwekers na een overgangperiode algemeen gebruik zullen gaan maken van de voorgestelde benamingen. Om deze gewenning te vergemakkelijken hebben we hieronder een tabel met de nieuwe standaardnamen en de "oude namen" toegevoegd.

| Standaard naam mutatie | Oude benaming                          |
|------------------------|--|
| Groen                  | Wildkleur                              |
| Blauw                  | Blauw                                  |
| Cinnamon               | Isabel                                 |
| Bleekkop (pale) Fallow | Buttercup, geelkop roodoog, dun fallow |
| BronzeFallow           | Recessief cinnamon                     |
| Grijsgroen             | Olijf                                  |
| Grijs                  |  |
| Turquoise              | Pastelblauw, Zeegroen                  |
| Lutino                 | Geel                                   |
| Dominant gezoomd       | Fallow, Pastel                         |
| Overgoten              | Gele/witte zwartoog                    |
| Pallid                 | Lacewing, Isabel                       |
| D Groen                | Donkergroen                            |
| DD Groen               | Olijfgroen                             |
| Bleekstaart            | Geelkop geelstaart                     |
| Misty                  | Bleekgroen                             |
| Opaline                | Grijskop                               |
| Recessief Bont         | Afr. Bont, Opaline                     |
| Violet                 | Amerikaans Kobalt                      |
| D blauw                | Kobaltblauw                            |
| DD blauw               | Mauve                                  |

### 3: De kleurvererving van de Edelparkieten mutaties.

Voor een uitgebreide behandeling van de regels van de erfelijkheidsleer wordt verwezen naar het werkje "Algemene erfelijkheidsleer" verkrijgbaar op het bondsbureau van de NBvV.

#### Autosomaal recessief verervende mutaties.

|                        |   |
|------------------------|---|
| <i>Turquoise</i>       | <i>Reductie psittacine tot 30 %, multiple allele van de blauwfactor<br/>Symbool: bl<sup>q</sup></i>                                     |
| <i>Hemelsblauw</i>     | <i>Volledige reductie psittacine.<br/>Symbool: bl</i>   |
| <i>Brons Fallow</i>    | <i>De donkere vorm van fallow. Vleeskleurige poten, ondersnavel donkerrood.<br/>Oogkleur rood met geelachtige iris.<br/>Symbool: bz</i> |
| <i>Bleekkop Fallow</i> | <i>Het lichte type fallow. Vleeskleurige poten, ondersnavel donker rood.<br/>Oogkleur rood zonder zichtbare iris.<br/>Symbool: cf</i>   |
| <i>Bleekstaart</i>     | <i>Plaatselijke reductie van eumelanine in kop, staart en onderbuik<br/>Symbool: ct</i>   |
| <i>Recessief bont</i>  | <i>Onregelmatig bontpatroon. Koptekening ontbreekt<br/>Symbool: s</i>   |
| <i>Recessief Ino</i>   | <i>Volledige reductie eumelanine<br/>Symbool: a</i>   |
| <i>Overgoten</i>       | <i>Reductie van het eumelanine tot ongeveer 20%<br/>Symbool: Dil</i>  |

#### Autosomaal dominant verervende mutaties.

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <i>Grijs</i>            | <i>Door verandering inwendige vederstructuur geen reflectie van blauw<br/>Symbool: G</i>  |
| <i>Dominant Gezoomd</i> | <i>Reductie van het eumelanine tot ongeveer 50%, in het hart van de veer. De<br/>veerranden hebben bijna volledig pigment<br/>Symbool: Ed</i> |
| <i>Misty</i>            | <i>Reductie van het eumelanine tot ongeveer 75%<br/>Symbool: Mt</i>   |

#### Autosomaal onvolledig dominant verervende mutaties.

|                     |  |
|---------------------|--|
| <i>Donkerfactor</i> | <i>Door verandering van de baardbouw, kleinere baarddiameter en minder<br/>diepe bewolkte zone vindt er meer absorptie van licht plaats, waardoor de<br/>totaalkleur donkerder wordt.<br/>Symbool: D</i> |
| <i>Violetfactor</i> | <i>De structuur van de sponszone is veel fijner geworden waardoor er<br/>interferentie optreedt met als gevolg het terugkaatsen van violet in plaats<br/>van blauw licht.<br/>Symbool: V</i>             |

#### Geslachtgebonden recessief verervende mutaties.

|                  |   |
|------------------|---|
| <i>Ino</i>       | <i>Volledige reductie eumelanine<br/>Symbool: Xino</i>  |
| <i>Cinnamon:</i> | <i>Kwalitatieve reductie van het eumelanine. Dit is bruin in plaats van zwart van<br/>kleur<br/>Symbool: Xcin</i>               |
| <i>Pallid</i>    | <i>Reductie van eumelanine, ook in de ogen en de poten, multiple allele met<br/>ino<br/>Symbool: Xino<sup>pd</sup></i>          |
| <i>Opaline</i>   | <i>Kwantitatieve reductie van het eumelanine op het rugdek, de borst en de<br/>buik. Toont vleugelspiegel.<br/>Symbool: Xop</i> |

#### Geslachtgebonden dominant verervende mutaties.

**Nog niet bekend.**

## 4. Standaard Edelparkieten

### Afrikaanse halsbandparkiet (*Psittacula krameri parvirostris*) Scopoli 1769

**Algemeen: Herkomst West Afrika, Senegal, Luanda en Zuid Susan.**

**Formaat: 40 cm**

**Ringmaat: 6 mm**

#### **De fysieke standaard van de Afrikaanse halsbandparkiet**

##### **Conditie:**

Conditie is een eerste vereiste. Een vogel zonder een goede conditie kan nooit voor een hoge puntenwaardering in aanmerking komen. De vogel moet een gezonde en levendige indruk geven zonder verminkingen of andere gebreken.

Het oog is helder en het verenkleed dient rein en ongeschonden te zijn en voorzien van een natuurlijke glans.

##### **Formaat:**

De lengte van de Afrikaanse halsbandparkiet is 40 cm. De staart bepaalt ongeveer 45% van de totale lengte.

##### **Model:**

Een ideale Afrikaanse halsbandparkiet is een slanke vogel in verhouding tot de Indische halsbandparkiet. De ruglijn vormt vanuit de nek tot aan de punt van de staart een bijna rechte lijn.

De schouders zijn smal. De hals is kort, in een strak vloeiende lijn verlopend met de ronde borst. Vanaf de aars tot de punt van de staart moet deze lijn weer recht zijn. Het achterlijf mag niet uitgezakt zijn.

##### **Houding:**

De Afrikaanse halsbandparkiet neemt de juiste houding aan als de ruglijn van de vogel een hoek van 50 graden met het horizontaal maakt. De poten zijn fijn en voorzien van vier tenen die de stok zo omklemmen, dat de vogel vrij zit van het hout.

De dijen zijn zichtbaar. Het type is aangepast aan het formaat, als de juiste stand wordt aangenomen komt dit het type ten goede.

##### **Kop:**

De grootte van de kop is in verhouding met het lichaam deze is niet grof maar moet wel passen bij het postuur. De kop is rond en bol. De snavelbasis is smal. De lengte van de schedel richt zich iets naar beneden waardoor een mooie ooglijn wordt verkregen. Vrijwel in het centrum van de kop bevindt zich aan weerszijden de oogkas.

##### **Poten:**

Het loopbeen moet recht zijn, zonder vergroeiingen of verruwing. Twee tenen staan naar voren geplaatst en twee tenen naar achteren. De tenen dienen voorzien te zijn van eenkleurige gelijkmatige gebogen nagels.

##### **Snavel:**

De snavel is smal. De snavel oogt smal, is goed gerond en vormt met de schedel een vloeiend gebogen lijn. De bovensnavel is een haaksnavel die voorzien is een inkeping. De punt van de bovensnavel steekt enkele mm over de ondersnavel. Bij een goed gesloten snavel voegt de ondersnavel zich gedeeltelijk in de in de bovensnavel.

##### **Bevedering:**

De bevedering is compleet, dicht en aaneengesloten. Elke veer is vrijwel gelijk aan de naastliggende. De vleugels, tamelijk kort in de vleugelbocht worden strak langs het lichaam gedragen en dekken de rug gedeeltelijk af. Er zijn zeven handpennen zichtbaar. De staart is relatief lang, gesloten en aan het enigszins afgerond. De staart bestaat uit twaalf pennen, die trapsgewijs korter worden. De twee bovenste pennen zijn het langst. De onderzijde wordt afgeschermd door de onderstaart dekveren.

| <b>Kleurslag/soort</b>            | <b>Man: Afrikaanse halsbandparkiet 40 cm</b>                                     | <b>Pop: Afrikaanse halsbandparkiet 39 cm</b>                                     | <b>Man: Indische halsbandparkiet 42 cm</b>  | <b>Pop: Indische halsbandparkiet 41 cm</b>  |
|-----------------------------------|--|--|---|---|
| <b>Formaat:</b>                   | <b>(wildkleur)</b>   | <b>(wildkleur)</b>   | <b>(wildkleur)</b>  | <b>(wildkleur)</b>  |
| Voorhoofd en wangen.<br>Achterkop | Helder lichtgroen<br><br>Groen met blauwe waas                                   | Grasgroen,iets doffer dan bij de man   | Helder lichtgroen<br><br>Groen met hemelsblauwe waas                                | Lichtgroen,doffer dan bij man   |
| Hals en borst                     | Grasgroen  | Grasgroen  | Groen,lichtgrijs bewaasd  | Groen,zeer licht grijsachtig bewaasd  |
| Buik                              | Egaal grasgroen  | Egaal grasgroen  | Egaal lichtgroen  | Egaal lichtgroen  |
| Mantel en onderrug                | Grasgroen  | Grasgroen  | Groen met iets grijze aanslag   | Groen met iets grijze waas  |
| Stuit                             | Helder grasgroen   | Helder grasgroen   | Helder groen  | Helder groen  |
| Hand - en armpennen               | Donkergroen, buiten vlag diep groen,binnenvlag zwartgrijs. Binnenzijde geelgroen | Donkergroen, buitenvlag grasgroen,binnen vlag donkergroen. Binnenzijde geelgroen | Grijszwart,buiten - vlag diepgroen,binnen - vlag zwartgrijs. Binnenzijde geelgroen  | Grijszwart,buiten vlag diepgroen,binnen vlag zwartgrijs. Binnenzijde geelgroen      |
| Vleugel dekveren                  | Groen,iets bewaasd<br>Duimveertjes groen   | Grasgroen,iets bewaasd<br>Duimveertjes groen                                     | Groen iets bewaasd<br><br>Duimveertjes groen  | Groen iets bewaasd<br><br>Duimveertjes groen  |
| Middelste staartpennen            | Helder groen overgaand in blauw met een geel puntje                              | Heldergroen overgaand in blauw met een geel puntje                               | Heldergroen overgaand in blauw met een geelgroen puntje                             | Heldergroen overgaand in blauw met een geelgroen puntje                             |
| Overige staartpennen              | Helder groen   | Helder groen   | Heldergroen   | Heldergroen   |
| Onderzijde onderstaart dekveren   | Geelgroen<br>Groen   | Geelgroen<br>Groen   | Geelgroen<br>Groen  | Geelgroen<br>Groen  |
| Bovenstaart dekveren              | Heldergroen  | Groen  | Heldergroen   | Groen   |
| Snavel                            | Donkerrood met zwarte waas en snavel punt<br>Onder snavel zwart.                 | Donkerrood met zwarte waas en snavel punt.<br>Ondersnavel zwart                  | Dieprood met een zwarte snavelpunt.<br>Ondersnavel zwart en donkerrood aan de basis | Dieprood met een zwarte snavelpunt.<br>Ondersnavel zwart en donkerrood aan de basis |
| Poten                             | Grijs  | Grijs  | Grijs   | Donkervleeskleurig  |
| Nagels                            | Donkergrijs  | Donkergrijs  | Donkergrijs   | Zwartgrijs  |
| Ogen                              | Zwart,met smalle bleke iris.   | Zwart met smalle bleke iris  | Zwart met smalle bleke iris   | Zwart met smalle bleke iris   |
| <b>Tekening:</b>                  |  |  |   |   |
| Voorhoofdsband                    | Zwart  | Grijsgroen   | Zwart   | Grijsgroen  |
| Keel                              | Zwart  | n.v.t.   | Zwart   | n.v.t.  |
| Hals/nekband                      | Zwart,in nek overgaand in diep roze. Boven de nekband een smalle blauwe rand     | Vaag groen   | Zwart,in nek overgaand in diep roze   | Dof grijs/bruin,op de plaats van het roze van man lichtgroen                        |
| Vleugelpennen                     | Slagpennen fijne crème zoom  | Slagpennen fijne crème zoom  | Slagpennen fijne crème zoom   | Slagpennen fijne crème zoom   |
| Vleugelbocht                      | Geel   | Geel   | Geel  | Geel  |
| Ooglid                            | Roze   | Roze   | Bleekroze   | Bleekroze   |
| Oogring                           | Rood   | Rood   | Rood  | Rood  |

**Keurtechnische aanwijzingen: Afrikaanse halsband parkiet**

Sterk dient gelet te worden op model en formaat. Het missen van een of meerdere nagels is een veelvoorkomende fout. De snavel dient gaaf te zijn. Bij kleur dient er rekening mee te worden gehouden dat de kleuren bij de edel parkieten niet de helderheid en intensiteit hebben zoals bij andere kromsnavels verwacht mag worden. De kleurscheiding tussen borst en buik is een vloeiende overgang, het is geen scherpe afscheiding. De nagels dienen eenkleurig te zijn.

De keeltekening en de nekband bij de man dienen een regelmatig verloop te hebben en mogen niet te iel zijn.

Het roze en blauw van de nekband zo diep mogelijk. De pop is in het geheel matter van kleur, maar dient wel zo egaal mogelijk te zijn op rug –en vleugeldek. De pop mist de nekband, door een andere vederstructuur ter plaatse is er wel nog een vage groene nekband zichtbaar, de kleur is wat helderder dan de kop zelf.

De nekband bij de man is pas in het derde levens jaar volledig op kleur, indien er in het tweede jaar al enige vorm va

Buiten het formaat is de Afrikaanse halsband direct te herkennen aan de donkerrode bovensnavel met zwarte punt t.o.v. de Indische halsband, ook is de kop wat ronder van vorm.

De benaming bij het keuren kan volstaan met alleen Afrikaanse halsband parkiet, zonder toevoeging van wildkleur of lichtgroen.

Mutanten niet bekend of te weinig gegevens over.

Voor alle duidelijk is de Indische halsband in deze standaard naast de Afrikaanse geplaatst. Voor mutanten van de Indische halsband verwijzen wij U naar deel 1 standaard edelparkieten, waar de Indische halsband geheel is in omschreven.

**Keurtechnische aanwijzingen: Indische halsbandparkiet**

Zie Afrikaanse halsband en deel 1 van standaard edel parkieten.

## Roze borstbaard parkieten

**Algemeen:** Van de roze borstbaard parkieten zijn 7 ondersoorten, die qua formaat en kleur van de snavel verschillend zijn, hiervan worden er 4 omschreven in deze standaard. De andere 3 ondersoorten komen zover bekend niet voor in West – Europa en/of de onderlinge verschillen te minimaal. De fysieke standaard geldt ook voor alle ondersoorten.

### **Java roze borstbaard parkiet (*Psittacula alexandri alexandri*) Linne 1758.**

Dit is de nominaatvorm en komt voor op Java, Bali, Indonesie en het zuiden van Borneo, waar hij waarschijnlijk is ingevoerd.

Formaat: 33 cm

Ringmaat 6 mm.

### **Dammerman's roze borstbaard parkiet (*Psittacula alexandri dammermani*) Chasen und Kloss 1932**

Deze ondersoort komt voor op de Karimundjawa eiland en Indonesie.

Formaat: 36 cm

Ringmaat: 7 mm

### **Nias rozeborstbaard parkiet (*Psittacula alexandri perionca*) Oberholser 1912**

Deze ondersoort komt voor op Nias eiland en Indonesie.

Formaat: 37 cm

Ringmaat: 7 mm

### **Simeulue rozeborstbaard parkiet (*Psittacula alexandri cala*) Oberholser 1912**

Deze ondersoort komt voor op de Simeulue eiland en Indonesie

Formaat: 36 cm

Ringmaat 7 mm

### **Indische rozeborstbaard parkiet (*psittacula alexandri fasciata*) P.L.S. Muller 1776**

Deze ondersoort is zowel in de natuur als bij de kwekers de meest voorkomende soort, er zijn dan ook al een aantal mutanten bij opgetreden.

Het verspreidingsgebied is Noord –India, Nepal tot Assam, Oost –Pakistan, Bangla Desh, Burma, Thailand, Indochina, als ook Hainan eiland en Mergui Archipelago.

Formaat: 33 cm

Ringmaat: 6 mm

### **Niet omschreven rozeborstbaard parkieten:**

#### **Babi rozeborstbaard parkiet (*Psittacula alexandri major*) Richmond 1902**

Zoals de toevoeging *Major* al aangeeft, is de Babi rozeborstbaard parkiet met zijn 38 cm de grootste ondersoort, binnen de groep rozeborstbaard parkieten. Hij lijkt veel op de Indische ondersoort, maar verschil vooral in formaat. Ook mist de Babi de blauwe en groene waas in de kop. De borstkleur is ook wat dieper en mist de lila waas. De Babi rozeborstbaard parkiet komt voor op de Babi –en Lasia Eilanden.

#### **Andamen rozeborstbaard parkiet (*Psittacula alexandri abotti*) Oberholser 1919**

De Andamen rozeborstbaard parkiet komt ook veel overheen met de Indische ondersoort, is alleen (36 cm) wat groter en over het algemeen wat lichter van kleur. De kop toont wel de blauwe waas, maar geen groene waas, ook de borstkleur is wat bleker met lila waas.

Deze ondersoort komt alleen voor op de Andamen Eilanden.

#### **Kangean rozeborstbaard parkiet (*Psittacula alexandri kangeanensis*) Hoogerwerf 1962**

Deze laatst ontdekte ondersoort verschilt maar weinig met de Dammerman's ondersoort. De snavel is groter en de kop mist de groene waas. De schouderlekken zijn helderder geel. Het formaat is 35 cm. De snavel bij zowel man als pop rood. Deze ondersoort komt alleen voor op de Kangean Eilanden.

### **Noot:**

**Wanneer U een van deze 3 niet beschreven ondersoorten tegen komt, verzoeken wij U dit te melden bij Uw keurmeester vereniging afdeling grote parkieten en/of bij de werkgroep edelparkieten. Indien nodig zullen ze dan alsnog opgenomen gaan worden in deze standaard.**

## **De fysieke standaard van de rozeborstbaard parkiet**

### **Conditie:**

Conditie is een eerste vereiste. Een vogel zonder conditie kan nooit voor een hoge puntenwaardering in aanmerking komen. De vogel moet een gezonde en levendige uitdrukking hebben zonder verminkingen of andere gebreken.

Het oog is helder en het verenkleed dient rein en ongeschonden te zijn en voorzien van een natuurlijke glans.

### **Formaat:**

De lengte van de rozeborstbaard parkieten, zit tussen de 33 cm en 38 cm in. T.o.v. de overige edel parkieten hebben de rozeborstbaard parkieten een relatief korte staart.

### **Model:**

Een ideale rozeborstbaard parkiet heeft een forse nek die vrij kort en breed is. De ruglijn vormt vanuit de nek tot aan de punt van de staart een rechte lijn.

De schouders zijn breed. De hals is kort, in een strak vloeiende lijn verlopend met de ronde borst. Vanaf de aars tot de punt van de staart moet deze lijn weer recht zijn. Het achterlijf mag niet uitgezakt lijken.

### **Houding:**

De rozeborstbaard parkiet neemt de juiste houding aan als de ruglijn van de vogel een hoek van 50 graden met het horizontaal maakt. De poten zijn stevig en voorzien van vier tenen die de stok omklemmen, dat de vogel vrij van stok hout.

De dijen zijn niet zichtbaar. Het type is aangepast aan het formaat, als de juiste stand wordt aangenomen komt dit het type ten goede.

### **Kop:**

De grootte van de kop is vrij fors maar moet wel passen bij het postuur. De kop is rond en bol met soms een iets afgeplatte schedel. De snavelbasis is breed. De lengte van de schedel richt zich iets naar beneden waardoor een mooie ooglijn wordt verkregen. Vrijwel in het centrum van de kop bevindt zich aan weerszijden een oogkas.

### **Poten:**

Het loopbeen moet recht en stevig zijn, zonder vergroeiingen of verruwing.

Twee tenen zijn naar voren geplaatst en twee tenen naar achteren. De tenen dienen voorzien te zijn van eenkleurige, gelijkmatig gebogen nagels.

### **Snavel:**

De snavel is krachtig en breed aangezet. De snavel oogt robuust, is goed gerond en vormt met de schedel een vloeiend gebogen lijn.

De bovensnavel is een haaksnavel die voorzien is van een inkeping. De punt van de bovensnavel steekt enkele mm over de ondersnavel. Bij een goed gesloten snavel voegt de ondersnavel zich gedeeltelijk in de bovensnavel.

### **Bevedering:**

De bevedering is compleet, dicht en aaneengesloten. Elke veer is vrijwel gelijk aan de naastliggende. De vleugels, tamelijk kort in de vleugelbocht worden strak langs het lichaam gedragen en dekken de rug gedeeltelijk af. Er zijn zeven handpennen zichtbaar.

De staart is relatief kort, gesloten en aan het eind enigszins afgerond. De staart bestaat uit twaalf pennen, die trapsgewijs korter worden. De twee bovenste pennen zijn het langst. De onderzijde wordt afgeschermd door onderstaart dekveren.

A.N.B.v.V. Standaard Edelparkieten, deel 2 de overige soorten

| Kleurslag                                     | Man:<br>Java roze borstbaard parkiet   | Pop:<br>Java roze borstbaard parkiet  | Man:<br>Dammerman's rozeborstbaard parkiet 36 cm  | Pop:<br>Dammerman's rozeborstbaard parkiet 36 cm              | Man:<br>Nias rozeborstbaard parkiet  | Pop:<br>Nias rozeborstbaard parkiet 37 cm |
|---|--|---------------------------------------|---|---|--|---|
| Formaat:                                      | 33 cm  | 33 cm                                 |   |   | 37 cm  |   |
| Kleur:  | (Wildkleur)  | (Wildkleur)                           | (Wildkleur)   | (Wildkleur)   | (Wildkleur)  | (Wildkleur)                               |
| Kop   | Helder grijs met blauwe waas   | Helder grijs met vage blauwe waas     | Helder blauwgrijs, voorhoofd iets groene waas   | Helder blauwgrijs met vage blauwe waas.                       | Lila op een grijze ondergrond. Voorhoofd groene waas.                                  | Gelijk aan man, iets vager                |
| Nek   | Heldergroen  | Heldergroen                           | Lichtgroen  | Lichtgroen  | Heldergroen  |   |
| Hals en borst                                 | Diep oranjerose met iets lila waas   | Gelijk aan man, iets doffer van kleur | Diep rozerood   | Gelijk aan man, iets doffer                                   | Rozerood, met lila waas  | Gelijk aan man, iets doffer               |
| Buik  | Groen met iets blauwe waas   |                                       | Lichtgroen  |   | Lichtgroen   |   |
| Mantel en onderrug                            | Groen met iets grijze waas   | Gelijk aan man                        | Heldergroen, iets bewaasd   | Gelijk aan man  | Heldergroen met iets grijze waas.  | Gelijk aan man                            |
| Stuit   | Heldergroen  |                                       | Helder lichtgroen   |   | Helder lichtgroen  |   |
| Hand - en armpennen                           | Groen overgaand in grijszwarte toppen. Buitenvlag is diepgroen, binnenvlag zwartgrijs. Geelgroen | Gelijk aan man                        | Lichtgroen overgaand in grijszwarte toppen. Buitenvlag is groen, binnenvlag zwartgrijs. | Gelijk aan man  | Lichtgroen overgaand in grijszwarte toppen. Buitenvlag is groen, Binnenvlag zwartgrijs | Gelijk aan man                            |
| Binnenzijde                                   |  |                                       | Geelgroen   |   | Geelgroen  |   |
| Vleugel dekveren                              | Groen, iets bewaasd  | Gelijk aan man                        | Heldergroen   | Gelijk aan man  | Heldergroen, iets bewaasd  | Gelijk aan man                            |
| Middelste staartpennen                        | Heldergroen overgaand in blauw   | Gelijk aan man                        | Helder lichtgroen overgaand in iets blauw .   | Gelijk aan man  | Heldergroen overgaand in blauw aan de toppen   | Gelijk aan man                            |
| Overige staartpennen en onderstaart dekveren. | Groen  | Gelijk aan man                        | Lichtgroen  | Gelijk aan man  | Heldergroen  | Gelijk aan man                            |
| Onderzijde staart                             | Groen  |                                       | Lichtgroen  |   | Heldergroen  |   |
| Onderzijde staart                             | Geelgroen  |                                       | Geelgroen   |   | Geelgroen  |   |
| Bovenstaartdekveren                           | Heldergroen  | Gelijk aan man                        | Helder lichtgroen   | Gelijk aan man  | Heldergroen  | Gelijk aan man                            |
| Snavel  | Rood met gele punt, ondersnavel oranjerood   | Iets lichter dan bij man              | Dieporanjerood, snavelpunt geel. Ondersnavel oranjerood                                 | Oranjerood snavelpunt iets lichter. Onder snavel iets lichter | Oranjerood, snavel punt geel. Ondersnavel zwart  | Zwart                                     |
| Snavelrand                                    | Bleek  | Gelijk aan man                        | Bleek   | Gelijk aan man  | Bleek  | Gelijk aan man                            |
| Neusdop                                       | Hoornkleurig   |                                       | Hoornkleurig  |   | Hoornkleurig   |   |
| Poten   | Grijs  | Grijs                                 | Lichtgrijs  | Lichtgrijs  | Donkervleeskleurig   | Donkervleeskleurig                        |
| Nagels  | Donkergrijs  | Donkergrijs                           | Grijs   | Grijs   | Donkergrijs  | Donkergrijs                               |
| Ogen  | Zwart met smalle bleke iris  | Zwart met bleke iris                  | Zwart met bleke iris  | Zwart met bleke iris  | Zwart met bleke iris   | Zwart met bleke iris                      |
| Tekening:                                     |  |                                       |   |   |  |   |
| Keel  | Zwart, onderzijde licht lila rand  | Zwart                                 | Zwart, onderzijde een lichte lila rand  | Zwart   | Zwart, onderzijde lila rand  | Zwart                                     |
| Voorhoofdsband                                | Zwart  | Zwart, iets smaller dan bij man       | Zwart   | Zwart, iets smaller dan bij man                               | Zwart  | Zwart, iets smaller dan bij man           |
| Oogring                                       | Iets groen   | Iets groen                            | Iets lichtgroen   | Iets lichtgroen   | Iets groen   | Iets groen                                |
| Kop/nek                                       | Strak afgelijnd  | Strak afgelijnd                       | Strak afgelijnd   | Strak afgelijnd   | Strak afgelijnd  | Strak afgelijnd                           |
| Nekband (pop)                                 | n.v.t.   | Rozerood                              | n.v.t.  | Bleek roze  | n.v.t.   | Lila roze                                 |
| Borst/buik                                    | Strak afgelijnd  | Strak afgelijnd                       | Strak afgelijnd   | Strak afgelijnd   | Strak afgelijnd  | Strak afgelijnd                           |
| Vleugelbalk                                   | Geelgroen  | Geelgroen                             | Geel met groene waas, aan onderzijde gezoomd  | Gelijk aan man, iets doffer                                   | Geelgroen  | Gelijk aan man, iets doffer               |
| Vleugelpennen                                 | Iets gezoomd   | Iets omzoomd                          | Iets omzoomd  | Iets omzoomd  | Iets omzoomd   | Iets gezoomd                              |
| Vleugelrand                                   | Bleekgeel  | Bleekgeel                             | Bleekgeel   | Bleekgeel   | Bleekgeel  | Bleekgeel                                 |

A.N.B.v.V. Standaard Edelparkieten, deel 2 de overige soorten

| Kleurslag   | Man:<br>Simeulue rozeborstbaard parkiet<br>36 cm   | Pop:<br>Simeulue rozeborstbaard parkiet<br>36 cm | Man:<br>Indische rozeborstbaard parkiet<br>33 cm   | Pop:<br>Indische rozeborstbaard parkiet<br>33 cm | Man:<br>Indische rozeborstbaard parkiet   | Pop:<br>Indische Rozeborstbaard parkiet    |
|---|--|--|--|--|---|--|
| Formaat:  |  |  |  |  |   |  |
| Kleur:  | <b>(wildkleur)</b>   | <b>(wildkleur)</b>                               | <b>(wildkleur)</b>   | <b>(wildkleur)</b>                               | <b>D groen</b>  | <b>D groen</b>                             |
| Kop   | Blauwgrijs   | Blauwgrijs iets donker dan bij man               | Helder blauwgrijs, met lila waas, voorhoofd groen bewaasd<br>Groen                         | Gelijk aan man iets donker                       | Helder blauwgrijs, met lila waas, voorhoofd iets groener waas<br>Donkergroen  | Gelijk aan man iets donker                 |
| Nek   | Diepgroen  |  |  |  |   |  |
| Hals en borst.  | Lila roze  | Gelijk aan man ,iets donker                      | Diep roze met lila waas<br>Groen   | Diep roze, zonder lila waas<br>Groen             | Diep roze met lila waas<br>Donkergroen  | Diep roze, zonder lila waas<br>Donkergroen |
| Buik  | Zeegroen, dijen groen  |  |  |  |   |  |
| Mantel onderrug   | Grijsgroen   | Gelijk aan man                                   | Diepgroen, iets bewaasd<br>Groen   | Gelijk aan man                                   | Diep donkergroen, iets bewaasd<br>Donkergroen   | Gelijk aan man                             |
| Stuit   | Diepgroen  |  |  |  |   |  |
| Hand - en armpennen   | Diepgroen overgaand in grijszwarte toppen.<br>Buitenvlag donkergroen, binnenvlag zwartgrijs. | Gelijk aan man                                   | Diepgroen overgaand in grijszwarte toppen.<br>Buitenvlag diepgroen, binnenvlag zwartgrijs. | Gelijk aan man                                   | Diep donkergroen overgaand in grijs-zwarte toppen.<br>Buitenvlag diep donkergroen, binnenvlag zwartgrijs<br>Geelgroen | Gelijk aan man                             |
| Binnenzijde   | Geelgroen  |  | Geelgroen  |  |   |  |
| Vleugel dekveren  | Grijsgroen   | Gelijk aan man                                   | Diepgroen iets bewaasd   | Gelijk aan man                                   | Diep donkergroen, iets bewaasd  | Gelijk aan man                             |
| Middelste staartpennen  | Diepgroen overgaand in blauw   | Gelijk aan man                                   | Groen overgaand in blauw   | Gelijk aan man                                   | Donkergroen overgaand in kobaltblauw  | Gelijk aan man                             |
| Overige staartpennen en onderstaart dekveren<br>Onderzijde staart | Diepgroen<br>Diepgroen<br>Geelgroen  | Gelijk aan man                                   | Groen<br>Groen<br>Geelgroen  | Gelijk aan man                                   | Donkergroen<br>Donkergroen<br>Geelgroen   | Gelijk aan man                             |
| Bovenstaart dekveren  | Diepgroen  | Gelijk aan man                                   | Groen  | Gelijk aan man                                   | Donkergroen   | Gelijk aan man                             |
| Snavel  | Oranjerood met gele punt, ondersnavel zwart  | Zwart  | Rood met gele punt, ondersnavel zwart.   | Zwart  | Rood met gele punt, ondersnavel zwart   | Zwart                                      |
| Snavelrand<br>Neusdop   | Bleek<br>Hoorinkleurig   | Gelijk aan man                                   | Bleek<br>Hoorinkleurig   | Gelijk aan man                                   | Bleek<br>Hoorinkleurig  | Gelijk aan man                             |
| Poten   | Grijs  | Grijs  | Donkervleeskleurig   | Donkervleeskleurig                               | Grijs   | Grijs                                      |
| Nagels  | Donkergrijs  | Donkergrijs                                      | Grijs  | Grijs  | Zwartgrijs  | Zwartgrijs                                 |
| Ogen  | Zwart met bleke iris   | Zwart met bleke iris                             | Zwart met bleke iris   | Zwart met bleke iris                             | Zwart met bleke iris  | Zwart met bleke iris                       |
| <b>Tekening:</b>  |  |  |  |  |   |  |
| Keel  | Zwart, onderzijde lila rand  | Zwart  | Zwart, onderzijde lila roze rand   | Zwart  | Zwart, met lila rand  | Zwart                                      |
| Voorhoofdsband  | Zwart  | Zwart ,iets smaller dan bij man                  | Zwart  | Zwart  | Zwart   | Zwart                                      |
| Oogring   | Vaag groen   | Vaag groen                                       | Groen  | Groen  | Donkergroen   | Donkergroen                                |
| Kop/nek en borst/buik   | Strak afgelijnd  | Strak afgelijnd                                  | Strak afgelijnd  | Strak afgelijnd                                  | Strak afgelijnd   | Strak afgelijnd                            |
| Nekband (pop)   | n.v.t.   | Lila roze  | n.v.t.   | Diep roze  | n.v.t.  | Lila roze                                  |
| Vleugelbalk   | Groengeel  | Groengeel iets vager dan bij man                 | Geelgroen  | Geelgroen iets vager dan bij man                 | Geelgroen   | Geelgroen iets vager dan bij man           |
| Vleugelpennen<br>Vleugelrand                                      | Licht omzoomd<br>Bleekgeel   | Licht omzoomd<br>Bleekgeel                       | Licht omzoomd<br>Bleekgeel   | Licht omzoomd<br>Bleekgeel                       | Licht omzoomd<br>Bleekgeel  | Licht omzoomd<br>Bleekgeel                 |

**Mutanten :Indische rozeborstbaard parkieten**

| <b>Kleurslag</b>                             | <b>Man:</b>   | <b>Pop:</b>                           | <b>Man:</b>  | <b>Pop:</b>                                  | <b>Man:</b>  | <b>Pop:</b>               |
|--|---|---------------------------------------|--|--|--|---------------------------|
| <b>Kleur:</b>                                | <b>Grijsgroen</b>   | <b>Grijsgroen</b>                     | <b>Turquoise</b>   | <b>Turquoise</b>                             | <b>Blauw</b>   | <b>Blauw</b>              |
| Kop  | Grijs met lila waas   | Grijs                                 | Licht paars met roze waas, bij voorhoofd meer blauw.                                       | Grijs met roze waas,bij voorhoofd meer blauw | Licht lila,bij voorhoofd meer blauw  | Gelijk aan man,iets vager |
| Nek  | Grijsgroen  | Grijsgroen                            | Zeegroen   | Zeegroen                                     | Blauw  |                           |
| Hals en borst                                | Roze/lila, met grijze waas  | Roze met grijze waas                  | Licht paars met roze waas  | Lila met roze waas                           | Licht lila   | Gelijk aan man iets vager |
| Buik   | Grijsgroen  | Grijsgroen                            | Zeegroen   | Zeegroen                                     | Blauw  |                           |
| Mantel onderrug                              | Grijsgroen met lichte waas  | Gelijk aan man                        | Diep zeegroen met lichte waas  | Gelijk aan man                               | Diep blauw met lichte waas   | Gelijk aan man            |
| Stuit  | Grijsgroen  |                                       | Zeegroen   |  | Blauw  |                           |
| Hand - en armpennen                          | Grijsgroen overgaand in grijszwarte toppen,buitenvlag grijsgroen,binnen vlag zwartgrijs | Gelijk aan man                        | Zeegroen overgaand in grijszwarte toppen. Buitenvlag diep zeegroen,binnen vlag zwartgrijs. | Gelijk aan man                               | Diep blauw overgaand in grijszwarte toppen. buitenvlag diepblauw,binnen vlag zwartgrijs. | Gelijk aan man            |
| Binnenzijde                                  | Geelgrijs   |                                       | Bleek geelgroen  |  | Wit met blauwe waas  |                           |
| Vleugel dekveren                             | Grijsgroen  | Gelijk aan man                        | Diep zeegroen met lichte waas  | Gelijk aan man                               | Diep blauw met lichte waas   | Gelijk aanman             |
| Middelste staartpennen                       | Grijsgroen overgaand in grijze toppen   | Gelijk aan man                        | Zeegroen overgaand in blauwe toppen  | Gelijk aan man                               | Blauw overgaand in diep blauw toppen   | Gelijk aan man            |
| Overige staartpennen en onderstaart dekveren | Grijsgroen  | Gelijk aan man                        | Zeegroen   | Gelijk aan man                               | Blauw  | Gelijk aan man            |
| Onderzijde staart                            | Grijsgroen  |                                       | Zeegroen   |  | Blauw  |                           |
| Bovenstaart dekveren                         | Geelgrijs   |                                       | Bleek geelgroen  |  | Wit met blauwe waas  |                           |
| Snavel                                       | Grijsgroen  | Gelijk aan man                        | Zeegroen   | Gelijk aan man                               | Blauw  | Gelijk aan man            |
| Snavelrand                                   | Rood met gele punt, ondersnavel zwart   | Zwart                                 | Rood met gele punt, ondersnavel zwart  | Zwart  | Rood met bleke punt, ondersnavel zwart   | Zwart                     |
| Neusdop                                      | Bleek Hoornkleurig  | Gelijk aan man                        | Bleek Hoornkleurig   | Bleek Hoornkleurig                           | Bleek Hoornkleurig   | Bleek Hoornkleurig        |
| Poten  | Grijs   | Grijs                                 | Grijs  | Grijs  | Grijs  | Grijs                     |
| Nagels                                       | Grijs   | Grijs                                 | Grijs  | Grijs  | Grijs  | Grijs                     |
| Ogen   | Zwart,met bleke iris  | Zwart ,met bleke iris                 | Zwart met bleke iris   | Zwart met bleke iris                         | Zwart met bleke iris   | Zwart met bleke iris      |
| <b>Tekening:</b>                             |   |                                       |  |  |  |                           |
| Keel/baard                                   | Zwart,onderzijde een lila grijze rand   | Zwart                                 | Zwart,onderzijde lila rand   | Zwart  | Zwart,onderzijde lila rand   | Zwart                     |
| Voorhoofdsband                               | Zwart   | Zwart                                 | Zwart  | Zwart  | Zwart  | Zwart                     |
| Oogring                                      | Vaag grijsgroen   | Vaag grijsgroen                       | Lichtzeegroen  | Lichtzeegroen                                | Blauw  | Vaag blauw                |
| Kop/nek en borst/buik                        | Strak afgelijnd   | Strak afgelijnd                       | Strak afgelijnd  | Strak afgelijnd                              | Strak afgelijnd  | Strak afgelijnd           |
| Nekband (pop)                                | n.v.t.  | Roze met grijze waas                  | n.v.t.   | Bleek roze                                   | n.v.t.   | Wit                       |
| Vleugelbalk                                  | Geelgrijsgroen  | Geelgrijsgroen iets vager dan bij man | Bleek geelgroen  | Bleek geelgroen,vager dan bij man            | Lichtgrijs   | Dof grijs                 |
| Vleugelpennen                                | Licht omzoomd   | Licht omzoomd                         | Licht omzoomd  | Licht omzoomd                                | Licht omzoomd  | Licht omzoomd             |
| Vleugelrand                                  | Bleekgeel   | Bleekgeel                             | Wit met vage gele waas   | Wit met vage gele waas                       | Wit  | Vage witte pareltekening  |

### **KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: (K.T.A)**

#### **Java rozeborstbaard parkiet:**

Sterk dient gelet te worden op model en formaat. Te smalle en/of te kleine vogels dienen te worden bestraft. Ook een goede conditie is een eerste vereiste.

Het missen van een of meer nagels is een veelvoorkomende fout. De snavel dient gaaf te zijn. Bij kleur dient rekening te worden gehouden ,dat de kleuren van de edelparkieten niet die helderheid en intensiteit hebben zoals bij andere kromsnavels verwacht mag worden. Wel dient er streng gelet op te worden dat de lichaamskleur geen zwarte omzoming toont,dit komt door het afknagen van de veer toppen. De kleurscheiding tussen borst en buik dient zo strak mogelijk te zijn,de diepst gekleurde borstkleur geniet de voorkeur. De nagels dienen eenkleurig te zijn. De keel/baard tekening loopt strak vanaf de ondersnavel tot in de nek en met een boog onderlangs de hals. De voorhoofdsband is enkele millimeters en loopt van oog tot oog. De vleugelbalk dient zo strak mogelijk te zijn aan onderzijde iets soepeler beoordelen.

De pop is over het algemeen doffer van kleur en tekening en is vooral te herkennen aan de rozerode nekband dit geldt ook bij alle ondersoorten.

Beide geslachten bezitten een rode snavel.

Hier zit ook het grootste verschil in met de Indische rozeborstbaard parkiet waarbij de pop een zwarte snavel bezit en de man hiervan een zwarte ondersnavel heeft. Ook is de kopkleur van de Java meer grijs en minder blauw bewaasd.

Jonge vogels hebben een groene kop met een grijze aanslag een groenachtige borst en kortere staart. Op 2 jarige leeftijd krijgen ze het volwassen verenkleed.

#### **Dammerman's rozeborstbaardparkiet:**

Deze ondersoort gelijk erg veel op de Java,maar zijn duidelijk groter en een veel forsere snavel. De kleur van de snavel is wel gelijk. De kruin is wat blauwer van tint en de lichaamskleur helderder groen. Ook de schoudervlek en nek zijn helderder ,meer geel.

Zie ook KTA bij Indische -en Java rozeborstbaard parkiet.

#### **Nias rozeborstbaard parkiet:**

Volwassen vogels lijken op de Indische rozeborstbaard parkieten,maar is groter van formaat.

Ook de gehele lichaamskleur is helderder dan bij de Indische. De grijze kop mist blauwe en groene aanslag en de borst mist de lila waas.

Verder (incl) snavel gelijk aan Indische rozeborstbaard parkiet.

#### **Simuelue rozeborstbaard parkiet:**

Deze ondersoort lijkt veel op de Indische ondersoort,maar is iets groter. Ook is de kleur wat lichter en opvallend is de zeegroene buikkleur en groene dijen. De grijze kop mist de groene waas en de borstkleur is lichter en mist de lila waas.

De snavelkleur is wel gelijk aan de Indische.

Zie ook de Java –en Indische rozeborstbaard parkiet.

#### **Indische rozeborstbaard parkiet:**

Dit is de meest gehouden baard parkiet . De pop is vager van kleur. Komt veel overheen met de Java ,de snavelkleur is het grootste verschil,deze is bij de Indische bij de man zwart aan de ondersnavel en bij de pop geheel zwart. Ook is de borstkleur dieper roze en heeft een lila waas en de kop is blauwer en rond de snavel groen bewaasd. De vleugelbalk is weer doffer bij de Indische. De buik toont wat blauwe waas. Poppen missen de lila waas op de borst.

Advies bij het keuren wanneer het formaat duidelijk afwijkt ,om de andere ondersoorten te bestuderen en dan keuren waar het dichtst bij komt.

Zie ook Java rozeborstbaard parkiet.

#### **Mutanten van de Indische rozeborstbaard parkiet:**

Tot nu toe zijn er enkel bij de Indische ondersoort mutaties opgetreden,uiteeraard kan dit ook bij de overige soorten gebeuren. De snavelkleur kan hierbij een duidelijke indicatie zijn! Men dient er dan wel streng op te letten dat de onderling verschillen zoals bij de wildkleuren ook waarneembaar zijn ,evenals het formaat.

Alle ontstaande mutanten zijn nog niet opgenomen in deze standaard, omdat hier nog niet genoeg of juiste gegevens over bekend zijn. Indien U niet omschreven mutaties of combinaties hiervan tegen komt ,zowel bij kweker,vogelbeurs of tentoonstelling,dan dit melden bij Uw keurmeester vereniging sectie grote parkieten en /of werkgroep edelparkieten.

#### **Indische rozeborstbaard parkiet donkergroen:**

Bij deze nog zeldzame mutatie zijn alle groene veervelden nu donkergroen geworden,ook het blauw in de staart is nu kobaltblauw geworden. De snavelkleur en borstkleur blijven gelijk. Ook de vleugelbalk is gelijk van kleur als bij de wildkleur,alleen geeft dit nu een groter contrast met het donkergroene rug/vleugeldek.

De donkergroene is een vogel met 1 donker factor bij zich, uit de paring donkergroen x donkergroen komen dan ook DD groen, vogels met een dubbele donker factor, welke in het verleden olijfgroen genoemd werden.

De donker factor vererft autosomaal dominant.

Verder gelijk aan wildkleur en Java.

#### **Indische rozeborstbaard parkiet grijsgroen:**

Ook deze mutatie is nog erg zeldzaam. De grijsgroen wordt door kwekers vaak foutief als olijf benoemd.

Hoewel de kleur wel iets olijfachtig heeft is, de olijf de oude benaming van een dubbele donkerfactor.

Het grootste verschil zit in het blauw bezit, dit wordt bij een dubbele donkerfactor mauve en bij de grijsgroen grijs van kleur. Bij de meeste parkietensoorten met een van oorsprong blauwe staart, wordt dit bij de grijsgroene zwart/grijs van kleur. Bij de Indische rozeborstbaard parkiet zien we dit ook, evenals een grijze waas over de grijsgroene lichaamskleur.

De lila waas in de kop komt door het rode carotenoïde bezit in de kop. Zowel het rood als geel carotenoïde worden niet aangetast door de grijs factor. De vleugelpennen laten ook geen blauw, maar grijs zien. Dat de borst roze/lila is komt door de vermenging van rood met grijs. We moeten streven naar een zo diep mogelijke grijsgroene kleur, uiteraard geldt dat hier voorlopig nog met enige soepelheid moet worden omgegaan. In combinatie met de blauw mutant zal er de grijze kleurslag ontstaan.

De grijs factor vererft autosomaal dominant.

Zie verder ook de wildkleur en de Java.

#### **Indische rozeborstbaard parkiet turquoise:**

Door de turquoise factor reduceert het carotenoïde, zowel het rood als geel. Hierdoor wordt de lichaamskleur zeegroen van kleur. Door het restant rood en de blauw structuur zien we nog een lila/roze borstkleur. De bovensnavel van de man blijft gewoon dieprood. Ook de zwarte veervelden, worden niet aangetast.

Speciaal gelet dient er op te worden dat de kleur egaal is en niet vlekkelig.

De turquoise vererft autosomaal recessief, maar is wel co – dominant over blauw.

Zie ook wildkleur en Java.

#### **Indische rozeborstbaard parkiet blauw:**

Bij de blauw mutant is al het carotenoïde geheel verdwenen. De lichtgroene veervelden worden hemelsblauw, de groene blauw en de donkere veervelden kobaltblauw. De borstkleur is licht lila door het nog aanwezige blauw structuur en zwart melanine. De vleugelbocht toont wel een witte bocht. De tekening's velden moeten wel strak zijn afgelijnd. De lichaamskleur moet ook zo egaal mogelijk en niet vlekkelig overkomen. Vaak zien we wat zwarte omzoming, vooral op het rug – en vleugeldek, dit is een kleurfout en wordt veroorzaakt door het afknagen van de toppen van de veertjes.

De blauwe vererft autosomaal recessief.

Zie ook de wildkleur en Java.

## Alexander parkieten (*Psittacula eupatria*) Linne 1766

### Algemeen:

Van de Alexander parkieten zijn er 4 ondersoorten bekend, die qua formaat, grote van de snavel, grote van de schoudervlek, breedte van de nekband en kleurdiepte van elkaar verschillen. Hiervan zijn er 2 in deze standaard opgenomen, de andere 2 komen zo ver wij weten niet voor bij de kwekers in Europa en/of de onderlinge verschillen zijn te minimaal. Door onwetendheid zijn door kwekers diverse ondersoorten regelmatig door elkaar gekweekt, daarom vragen we bij de mutanten maat 1 vorm, welke we in feite wetenschappelijk (*Psittacula eupatria domestica*) zouden kunnen noemen. De toevoeging *Domestica* geeft aan dat het hier om een geselecteerde vorm gaat. Tevens is deze keuze gemaakt om de wildkleur en ondersoorten fokzuiver te houden.

Alexander parkieten komen uit Zuidoost Azië.

De fysieke standaard geldt ook voor alle ondersoorten.

### Grote Alexander parkiet (*Psittacula eupatria eupatria*) Linne 1766

Dit is de nominaatvorm en komt voor in het Zuiden van India en Sri Lanka.

Mannen hebben een grotere en plattere kop, dit geldt ook voor de ondersoorten. De kleur is bij de grote Alexander het helderste groen. De roze nekband is op het breedste punt zo 5 mm breed.

Formaat: 58 cm, poppen zijn iets kleiner door een kortere staart.

Ringmaat: 8 mm.

### Nepalese Alexander parkiet (*Psittacula eupatria nippalensis*) Hodgson 1836

De Nepalese Alexander parkiet is duidelijk veel groter dan de grote Alexander parkiet, ook de snavel is groter en zwaarder dan bij de nominaatsoort. De roze nekband is dieper en breder (8 mm) en ook de schoudervlek is dieper en groter. De lichaamskleur is matter, meer grijsgroen. Het blauw in de nek is sprekender.

Verspreidingsgebied is Oost Afganistan, Pakistan, Centraal en Noord India, Nepal, Bangla Desh en Bhutan.

Formaat: 64 tot 70 cm, poppen iets kleiner.

Ringmaat: 8,5 mm.

### Laos Alexander parkiet (*Psittacula eupatria siamensis*) Kloss 1917

Dit is met zijn 55 cm de kleinste ondersoort en valt direct op door zijn zeer smalle hals – en nekband. Ook de schoudervlek is kleiner. Het rug – en vleugeldek is vrij heldergroen, maar de hals, achternek, borst en wangen zijn flink bewaasd.

Verspreidingsgebied is Vietnam, Cambodja, Laos en Noordwest Thailand.

Formaat: 55 cm

Ringmaat: 8 mm

Niet omschreven ondersoorten zijn:

### Andamen Alexander parkiet (*Psittacula eupatria magnirostris*) Ball 1872

Deze ondersoort wordt niet gehouden in Europa zover we weten. Hij valt op door zijn grote plompe snavel en groot formaat, gelijk aan de Nepalese ondersoort, wel is de Andamen helderder van kleur, ongeveer gelijk als de nominaatvorm, alleen de borst en buik hebben een lichtgrijze waas. Het blauw in de nek is dieper maar ook minder verspreid.

Verspreidingsgebied alleen op de Andamen Eilanden.

Formaat: 64 tot 70 cm, poppen iets kleiner.

Ringmaat: 8,5 mm

### Birma Alexander parkiet (*Psittacula eupatria avensis*) Kloss 1917

Komt erg veel overheen met de nominaatvorm, de verschillen zitten voornamelijk dat de halsband smaller is en de nekband (het roze) lichter is. Ook het blauw in de nek is lichter.

Verspreidingsgebied is Assam en Birma.

Formaat 58 cm

Ringmaat: 8 mm

## **Fysieke standaard van de Alexander parkieten:**

### **Conditie:**

Conditie is een eerste vereiste. Een vogel zonder conditie kan nooit voor een hoge puntenwaardering in aanmerking komen. De vogel moet een gezonde en levendige uitdrukking hebben, zonder verminkingen of andere gebreken.

Het oog is helder en het verenkleed dient rein en ongeschonden te zijn en voorzien van een natuurlijke glans.

### **Formaat:**

Deze staat per (onder) soort apart vermeldt, de staart bepaalt ongeveer 45% van de totale lengte.

### **Model:**

Een ideale Alexander parkiet heeft een forse nek die vrij kort en breed is. De ruglijn vormt vanuit de nek tot aan de punt van de staart een bijna rechte lijn.

De schouders zijn breed. De hals is kort, in een strak vloeiende lijn verlopend met de ronde borst. Vanaf de aars tot aan de punt van de staart moet deze lijn weer recht zijn. Het achterlijf mag niet uitgezakt lijken.

### **Houding:**

De Alexander parkiet neemt de juiste houding aan als de ruglijn van de vogel een hoek van 50 graden met het horizontaal maakt. De poten zijn stevig en voorzien van vier tenen die de stok zo omklemmen, dat de vogel vrij van het hout zit.

De dijnen zijn niet zichtbaar. Het type is aangepast aan het formaat, als de juiste stand wordt aangenomen komt dit het type ten goede.

### **Kop:**

De grootte van de kop is vrij fors maar moet wel passen bij het postuur. De kop is rond en bol met soms een iets afgeplatte schedel (vooral bij de mannen). De snavelbasis is breed. De lengte van de schedel richt zich iets naar beneden waardoor een mooie ooglijn wordt verkregen. Vrijwel in het centrum van de kop bevindt zich aan weerszijden een oogkas.

### **Poten:**

Het loopbeen moet recht en stevig zijn, zonder vergroeiingen of verruwing.

Twee tenen zijn naar voren geplaatst en twee tenen naar achteren. De tenen dienen voorzien te zijn van eenkleurige, gelijkmatig gebogen nagels.

### **Snavel:**

De snavel is krachtig en breed aanzet. De snavel oogt robuust, is goed gerond en vormt met de schedel een vloeiend gebogen lijn.

De bovensnavel is een haaksnavel die voorzien is van een inkeping. De punt van de bovensnavel steekt enkele mm over de ondersnavel. Bij een goed gesloten snavel voegt de ondersnavel zich gedeeltelijk in de bovensnavel.

### **Bevedering:**

De bevedering is compleet, dicht en aaneengesloten. Elke veer is vrijwel gelijk aan de naastliggende. De vleugels, tamelijk kort in de vleugelbocht worden strak langs het lichaam gedragen en dekken de rug gedeeltelijk af. Er zijn zeven handpennen zichtbaar.

De staart is relatief lang, gesloten en aan het eind enigszins afgerond. De staart bestaat uit twaalf pennen, die trapsgewijs korter worden. De twee bovenste pennen zijn het langst. De onderzijde wordt afgeschermd door onderstaart dekveren.

A.N.B.v.V. Standaard Edelparkieten, deel 2 de overige soorten

| Kleurslag                                    | Man: Grote Alexanderparkiet<br>58 cm                                      | Pop: Grote Alexanderparkiet<br>56 cm                      | Man: Nepalese Alexanderparkiet<br>64 tot 70 cm                        | Pop: Nepalese Alexanderparkiet<br>64 tot 67 cm            | Man: Laos Alexanderparkiet<br>55 cm  | Pop: Laos Alexanderparkiet<br>53 cm                        |
|--|---|---|---|---|--|--|
| Formaat:                                     | (wildkleur)   | (wildkleur)   | (wildkleur)   | (wildkleur)   | (wildkleur)  | (wildkleur)  |
| Voorhoofd en Wangen en achterkop             | Helder lichtgroen<br>Groen iets bewaasd,boven de nekband iets blauwe waas | iets donker dan bij man                                   | Groen<br>Groen met grijze waas,boven de nekband een blauwe waas       | iets donker dan bij man                                   | Heldergroen<br>Gelijk aan wangen,boven de nekband een lichtblauwe waas           | iets donker dan bij man                                    |
| Hals en borst.                               | Groen,met licht grijze waas.  | Groen,met zeer lichtgrijsachtige waas.                    | Groen ,met blauwgrijze waas   | Groen met grijze waas                                     | Groen met grijze waas  | Gelijk aan man   |
| Buik   | Egaal lichtgroen  | Egaal lichtgroen  | Egaal groen   | Egaal groen   | Egaal groen  |  |
| Mantel en onderrug                           | Groen met iets blauwgrijze waas.<br>Heldergroen                           | Gelijk aan man  | Groen met iets grijze waas.   | Gelijk aan man  | Donkergroen met grijze waas<br>Helder diepgroen                                  | Gelijk aan man   |
| Stuit  |   |   | Groen   |   |  |  |
| Hand - en armpennen                          | Grijszwart,buiten vlag diepgroen, binnenvlag zwartgrijs<br>Geelgroen      | Gelijk aan man  | Grijszwart,buiten vlag diepgroen, Binnenvlag zwartgrijs<br>Geelgroen  | Gelijk aan man  | Grijszwart,buiten vlag diepgroen,binnen vlag zwartgrijs<br>Geelgroen             | Gelijk aan man   |
| Binnenzijde                                  |   |   |   |   |  |  |
| Vleugel dekveren<br>Duimveertjes             | Groen iets bewaasd.<br>Groen  | Gelijk aan man  | Groen iets bewaasd<br>Groen   | Gelijk aan man  | Donkergroen iet bewaasd<br>Donkergroen   | Gelijk aan man   |
| Middelste staartpennen                       | Heldergroen overgaand in blauw, met aan de toppen een geelgroene punt     | Gelijk aan man  | Groen overgaand in blauw, met aan de toppen een geel-groene punt      | Gelijk aan man  | Diepgroen overgaand in diep blauw, met aan de toppen een geelgroene punt         | Gelijk aan man   |
| Overige staartpennen en onderstaart dekveren | Heldergroen<br>Geel   | Gelijk aan man  | Groen<br>Geel   | Gelijk aan man  | Diepgroen<br>Geel  | Gelijk aan man   |
| Bovenstaart dekveren                         | Heldergroen   | Gelijk aan man  | Groen   | Gelijk aan man  | Helder diepgroen   | Gelijk aan man   |
| Snavel                                       | Dieprood met iets lichte punt. Ondersnavel rood                           | Gelijk aan man  | Dieprood met iets lichte punt.<br>Ondersnavel rood                    | Gelijk aan man  | Rood met iets lichte punt.<br>Ondersnavel rood                                   | Gelijk aan man   |
| Snavelrand                                   | Bleek   | Bleek   | Bleek   | Bleek   | Bleek  | Bleek  |
| Poten  | Grijs   | Grijs   | Grijs   | Grijs   | Vleeskleurig   | Grijs  |
| Nagels                                       | Donkergrijs   | Donkergrijs   | Donkergrijs   | Donkergrijs   | Donkergrijs  | Donkergrijs  |
| Ogen   | Zwart met smalle bleekgele iris. Ooglid bleek roze. Washuid rode ring     | Gelijk aan man  | Zwart met smalle bleekgele iris. Ooglid bleek roze. Washuid rode ring | Gelijk aan man  | Zwart met smalle bleekgele iris. Ooglid bleek roze. Washuid rode ring            | Gelijk aan man   |
| <b>Tekening:</b>                             |   |   |   |   |  |  |
| Keel   | Zwart,onderzijde smalle bleek lichtgroene streep                          | n.v.t.<br>Grijs   | Zwart,onderzijde smalle bleek groene streep                           | n.v.t.<br>Grijs   | Zwart,kleiner als bij andere soorten,onder zijde bleekgele streep<br>Donkergroen | n.v.t.<br>Grijs  |
| Teugelstreep                                 | Grijs   |   | Diepgrijs   |   |  |  |
| Halsband                                     | Zwart   | Vaag dof grijs/bruin                                      | Zwart   | Vaag dof grijs/bruin.                                     | Zwart ,smaller dan bij andere soorten  | Vaag dof grijs/bruin.                                      |
| Nekband                                      | Roze (5 mm)   | Op de plaats van het roze van de man nu helder lichtgroen | Diep roze (8 mm)  | Op de plaats van het diep roze van de man nu helder groen | Zacht roze (3 mm)  | Op de plaats van het zacht roze van de man,nu helder groen |
| Schouderplek                                 | Donkerrood  | Donkerrood  | Diep donkerrood   | Diep donkerrood   | Donkerrood.<br>Kleiner dan bij andere soorten                                    | Gelijk aan man   |
| Grote vleugelpennen                          | Fijne crème omzoming  | Fijne crème omzoming                                      | Fijne crème omzoming  | Fijne crème omzoming                                      | Fijne crème omzoming   | Fijne crème omzoming                                       |
| Vleugelbocht                                 | Geel  | Geel  | Geel  | Geel  | Geel   | Geel   |

**Mutanten: Grote Alexanderparkieten**

| <b>Kleurslag</b>                                    | <b>Man:</b>   | <b>Pop:</b>  | <b>Man:</b>   | <b>Pop:</b>  | <b>Man +Pop:</b>  |
|---|---|--|---|--|---|
| <b>Kleur:</b>                                       | <b>Blauw</b>  | <b>Blauw</b>   | <b>Lutino</b>   | <b>Lutino</b>  | <b>Albino</b>   |
| Voorhoofd<br>Wangen en nek                          | Hemelsblauw<br>Blauw met grijze waas  | Gelijk aan man iets doffer                                   | Diep geel<br>Geel met witte waas                                      | Geel met een witte waas, in de<br>nek dieper geel        | Smetteloos wit  |
| Hals en borst<br><br>Buik                           | Blauw met lichtgrijze waas.<br>Egaal blauw  | Gelijk aan man, iets doffer                                  | Geel met witte waas<br><br>Egaal geel                                 | Gelijk aan man   | Smetteloos wit  |
| Mantel en onderrug<br><br>Stuit                     | Blauw met grijze waas<br><br>Hemelsblauw  | Gelijk aan man   | Zacht geel met witte waas<br><br>Geel                                 | Gelijk aan man   | Smetteloos wit  |
| Hand -en armpennen<br><br>Binnenzijde               | Grijszwart, buiten<br>Vlag diep blauw, binnenvlag<br>zwartgrijs.<br>Wit met blauwe waas | Gelijk aan man   | Wit. Buitenvlag<br>zachtgeel, binnen<br>vlag wit<br>Geel              | Gelijk aan man   | Smetteloos wit  |
| Vleugel dekveren<br><br>Duimveertjes                | Blauw met iets grijze waas<br>Blauw   | Gelijk aan man   | Diep geel met iets witte waas<br>Diepgeel                             | Gelijk aan man   | Smetteloos wit  |
| Middelste staartpennen                              | Hemelsblauw overgaand in<br>diep blauw. De toppen wit                                   | Gelijk aan man   | Diepgeel over-gaand in zacht-<br>geel. De toppen wit over             | Gelijk aan man   | Smetteloos wit  |
| Overige staartpennen en<br><br>onderstaart dekveren | Hemelsblauw<br><br>Blauw grijsachtig wit  | Gelijk aan man   | Geel<br><br>Diepgeel  | Gelijk aan man   | Smetteloos wit  |
| Bovenstaart dekveren                                | Hemelsblauw   | Gelijk aan man   | Diepgeel  | Gelijk aan man   | Smetteloos wit  |
| Snavel  | Dieprood met lichte punt,<br>ondersnavel rood   | Gelijk aan man   | Dieprood met lichte punt,<br>ondersnavel rood                         | Gelijk aan man   | Dieprood met lichte punt,<br>ondersnavel rood                             |
| Snavelrand  | Bleek   | Bleek  | Bleek   | Bleek  | bleek   |
| Poten   | Grijs   | Grijs  | Vleeskleurig  | Vleeskleurig   | Vleeskleurig  |
| Nagels  | Grijs   | Grijs  | Hoornkleurig  | Hoornkleurig   | Hoornkleurig  |
| Ogen  | Zwart met smalle bleke iris.<br>Ooglid bleekroze.<br>Washuid rode ring                  | Gelijk aan man   | Rood met smalle bleke iris.<br>Ooglid bleekroze. Washuid<br>rode ring | Gelijk aan man   | Rood met smalle bleke iris.<br>Ooglid bleekroze.<br>Washuid rode ring     |
| <b>Tekening:</b>                                    |   |  |   |  |   |
| Keel  | Zwart, onderzijde witte rand  | n.v.t.   | Wit   | n.v.t.   | n.v.t. ,door andere structuur<br>van de veer wel vaag wit<br>waarneembaar |
| Teugelstreep  | Grijs   | Grijs  | Donkergeel  | Donkergeel   | Zie keel  |
| Halsband  | Zwart   | Vaag dof grijs/blauw   | Wit   | Vaag diepgeel  | Zie keel  |
| Nekband   | Wit (7mm)   | Op de plaats van het wit bij de<br>man nu helder hemelsblauw | Diep roze (7 mm)  | Op de plaats van het diep roze<br>van de man nu okergeel | n.v.t.  |
| Schoudervlek  | Lichtgrijs  | Grijs  | Diep roze   | Diep roze  | n.v.t.  |
| Grote vleugelpennen                                 | Fijne witte omzoming  | Fijne witte omzoming   | n.v.t.  | n.v.t.   | n.v.t.  |
| Vleugelbocht  | Wit   | Wit  | n.v.t.  | n.v.t.   | n.v.t.  |

### **Keurtechnische aanwijzingen (K.T.A.)**

#### **Grote Alexander parkiet**

Sterk dient gelet te worden op model en formaat. Te smalle en/of te kleine vogels dien te worden bestraft. Het missen van een of meer nagels is een veel voorkomende fout. De snavel dient gaaf te zijn.

Bij kleur dient er rekening mee te worden gehouden dat de kleuren bij de edelparkieten niet die helderheid en intensiteit hebben zoals bij andere kromsnavels verwacht mag worden. Waar wel op bestraft dient te worden is wanneer vooral het vleugel en rugdek een zwarte omzoming tonen, dit wordt veroorzaakt door het afknagen van de veertoppen en is op de eerste plaats een bevedering's fout, wat echter ook een vlekkerige kleur veroorzaakt. De kleurscheiding tussen borst en buik is een vloeiende overgang, het is geen scherpe afscheiding. De nagels dienen eenkleurig te zijn. De keeltkening en de halsband dienen een regelmatig verloop te hebben en mogen niet te iel zijn.

Het roze en blauw van de nekband zo diep mogelijk. De pop is matter van kleur, dient wel zo egaal mogelijk van rug –en vleugeldek te zijn. De schouderdek dient donkerrood te zijn en strak afgelijnd, aan de onderzijde hiervan moet hier enige soepelheid aan worden gegeven. Een vlekkerige of niet complete en te kleine schouderdek dient streng gestraft te worden, bij tekening, dit duidt op hybride kenmerken met de halsband parkiet. Hybride's hiervan zijn vooral te herkennen aan de vage schouderdek, ook is het formaat/model bijna altijd een tussenvorm evenals de snavelvorm. Dit moet zeer streng bestraft worden, met een maximaal van 85 punten.

Regelmatig zien we Grote Alexander parkieten die groter zijn dan 58 cm, tot aan 60 cm mits de juist gevraagde kleur en tekeningsomschrijving dit niet bestraffen, worden ze echter groter dan keuren als Nepalese Alexander en bestraffen aan de hand van de standaard hiervan. Poppen zijn gelijk van model, alleen iets kleiner van formaat door een iets kortere staart. Ook zijn ze in het geheel matter van kleur. Mannen krijgen pas in het derde levensjaar hun volledige kleur en nekband, indien U mannen aantreft welke een gedeeltelijke nekband tonen, moet dit bestraft worden bij tekening. Mannen worden gekeurd in schaal 1 en poppen in schaal 2.

#### **Nepalese Alexander parkiet**

Het grootste verschil met de nominaatvorm is het formaat, wat wel 10 cm kan schillen. Hier moet dan ook duidelijk verschil in zijn. Ook de bovensnavel is veel forser van vorm. Het roze in de nek is veel dieper en breder, evenals de schouderdek. De lichaamskleur is ook veel meer bewaasd, met een grijsgroenachtige kleur, vooral in de wangen, rug/mantel en borst. Alleen het voorhoofd is helder lichtgroen van kleur. De lichaamskleur moet wel zo egaal mogelijk zijn en niet vlekkerig overkomen. De schouderdek moet strak strak afgelijnd, vooral aan de bovenzijde, de onderzijde moet hierin met enige soepelheid beoordeeld worden. Zie ook K.T.A. van de Grote Alexander parkiet

#### **Laos Alexander parkiet**

De Laos Alexander parkiet is nog een zeer zeldzame verschijning binnen Europa, toch komt hij al wel hier voor, vandaar de reden om hem in deze standaard te doen opnemen. Hij valt direct op door zijn klein formaat en toch vrij grove snavel. Ook de nek –en halsband zijn opvallend smal en mogen hierop niet bestraft worden, dit is een typisch kenmerk van de Laos. Ook de schouderdek is kleiner en helderder rood. Verder gelijk aan Grote Alexander parkiet.

#### **MUTATIES: Grote Alexander parkiet**

Hierin worden niet de ondersoorten apart gevraagd, maar alleen de nominaatvorm, groter door inkweek van de Nepalese is toegestaan.

#### **Grote Alexander parkiet blauw:**

Bij de blauw mutatie is al het gele en rode carotenoïde verdwenen, hierdoor ontstaat de blauwe. Het oorspronkelijke zwart bezit wordt niet aangetast. De grijze waas zoals die bij de (wildvorm) verlangt wordt moet ook bij de blauwe aanwezig zijn. De kleur moet zo diep en egaal mogelijk zijn en niet vlekkerig overkomen. De kopkleur is het diepst blauw. De halsband dient strak afgelijnd te zijn, evenals de witte nekband. De schouderdek is grijs van kleur en moet ook zo egaal mogelijk zijn. De snavelkleur is rood gebleven.

Speciaal gelet moet er worden op formaat en model en de fok zuiverheid, dat er geen halsband parkiet zichtbaar zijn. Dit is vooral te zien aan de kop/snavelvorm en de grote van de schouderdek.

Poppen zijn in het geheel matter van kleur.

De blauw factor vererft autosomaal recessief.

Zie ook K.T.A. van de (wildkleur)

#### **Grote Alexander parkiet lutino**

Bij de lutino is al het zwart melanine en blauwstructuur verdwenen, hierdoor ontstaat er een gele vogel. Ook de oogkleur is gemuteerd, deze is nu rood. Sterk dient er op worden gelet op model en formaat, het moet een

volle vogel zijn en de borst mag niet ingevallen zijn De lichaamskleur is niet geheel egaal geel,waar oorspronkelijk een grijze waas aanwezig was is dit nu wit bewaasd. Er mag geen groene waas zichtbaar zijn Alleen het voorhoofd, buik, stuit en staart zijn diep egaal geel. De vleugelpennen zijn wit met een zachtgele waas, wel geniet de diepst gekleurde de voorkeur. De rode schouderplek dient ook zo strak mogelijk te zijn afgelijnd en ook van juiste grote zijn, wel moet hier enige soepelheid toe gepast worden, vaak zie op het vleugeldek ook nog wat rood, dit wordt bij de (wildkleur) gemaskeerd. Wel geniet de strakst afgelijnde de voorkeur. De halsband bij de man is wit. De koptekening van de man dient zo strak mogelijk te zijn. Ook moet de lichaamskleur bij zowel man als pop schoon zijn zonder vuile aanslag. Ook hier moet streng gelet op worden, dat de vogel zuiver is en geen halve hybride.

De lutino vererft geslachtsgebonden recessief.

Zie ook de K.T.A. van de (wildkleur)

### **Grote Alexander parkiet albino**

De albino zal een brede forse vogel moeten zijn, zonder smalle borst of openstaande vleugels.

Als de vogel in goede lichamelijke conditie is zal deze smetteloos wit zijn zonder enige vuile aanslag. Soms toont een albino een blauwe of grijze aanslag, dit is een kleurfout. De staart dient volledig en smetteloos wit te zijn.

Door de vederstructuur zien we voornamelijk bij de mannen een vage witte halsband, deze mag niet een bruine waas tonen dat is een kleurfout.

De albino is een combinatie van de blauwe en lutino mutant

Zie ook de K.T.A. van de (wildkleur).

### **Noot:**

Bij zowel de lutino en albino zien we al regelmatig Grote Alexander parkieten welke nog een vage keeltekening tonen, ook de lichaamskleur is meer gebroken wit bij de albino.

Het betreft hier een combinatie vogel, waarvan nog niet met 100% zekerheid vast is gesteld of dit de misty of recessief grijs factor is in combinatie met de ino factor.

Wanneer U dit soort vogels ter keuring krijgt voorlopig keuren als mutant en het aanwezig zijn van de keeltekening bij een man mag niet bestraft worden

### **Niet beschreven en of bewezen, maar al wel ontstaande mutaties/kleuren zijn bij de Grote Alexander parkieten**

**Grijsgroen, donkergroen of violet factorig, cinnamon, bleekkop fallow, misty, turquoise, bont en de gezoomde, deze laatste kan ook de spangle zijn**

Deze zijn nog zo zeldzaam en van een aantal nog geen mannen geheel op kleur, dat het nu nog te vroeg is om ze nu al te doen opnemen in deze standaard. Zodra het aantal toeneemt en er meer gegevens over bekend zijn kan dit alsnog gebeuren.

## Rozekop parkiet - Grijskop edelparkiet –Pruimkop parkiet – Rothschild's parkiet:

### Algemeen:

Hoewel het hier om vier aparte soorten gaat,zijn de overeenkomsten zo groot,dat we ze voor een goede duidelijk overzicht toch bij elkaar geplaatst hebben. Vroeger werd de Rozekop als ondersoort van de pruimkop gezien en de Rothschild's als een hybride van de Grijskopedel en de Pruimkop. Gezien de grote overeenkomsten was dit niet vreemd,nu echter worden ze als aparte soort ,binnen het *genus Psittacula* omschreven. De soorten worden eerst ieder apart met eventuele ondersoorten algemeen omschreven en voor de fysieke standaard geldt dit voor alle vier de soorten tegelijk.

### Rozekop parkiet ( *Psittacula roseata roseata*) Biswas 1951

Verspreidingsgebied Noord Birma,Assam,,Oost Pakistan en Bangla Desh. Er is 1 ondersoort de Birma rozekop parkiet

De Rozekop lijkt erg veel op de Pruimkop,de rozekop is het duidelijkste verschil ,ook missen ze de blauwe waas in de nek. De lichaamskleur is wat lichter en de toppen van de staart,welke iets korter zijn, is geel i.p.v. wit zoals bij de Pruimkop. Ook het formaat is een stuk kleiner dan de pruimkop parkiet. Zowel man als pop bezitten de schouderplek,deze is ook iets groter dan bij de Pruimkop.

De pop is iets kleiner door een kortere staart lengte.

Tot zover bekend zijn er nog geen mutaties bekend van de rozekop,er gaan geruchten dat er een lutino zou zijn ontstaan,maar wij denken dat het hier om een lutino Grijskop edelparkiet gaat.

Formaat: 30 cm ,poppen 28 cm

Ringmaat: 5 mm

### Birma rozekop parkiet (*Psittacula roseata juneae*) Biswas 1951

Deze ondersoort met het verspreidingsgebied vanaf Zuid Assam,Birma,Thailand,Laos,Cambodja en Vietnam is niet in deze standaard opgenomen,gezien de minimale verschillen,met de nominaatvorm.

Het verschil is dat ze in het geheel iets lichter zijn, en de schouderplek iets groter is.

### Grijskop edelparkieten:

#### Himalaya grijskop edelparkiet (*Psittacula himalayana himalayana*) Lesson 1832

Dit is de nominaatvorm en heeft als verspreidingsgebied Zuidoost Azie,vanaf oostelijk Afganistan door Pakistan en Noordelijk India tot Nepal. Er is 1 ondersoort bekend.

Heeft zoals de naam al zegt een grijze kop,wordt door sommige ook wel foutief zwartkop parkiet genoemd. Lijken verder veel op de Pruimkop parkiet,zijn wel groter van formaat door de lange staart. Opvallend bij de grijskop parkieten is de staartkleur,deze is op het uiteinde zo 7 cm geel en is wordt ook weer wat breder op het einde.

Poppen zijn wat doffer van kleur en missen de schouderplek.

Formaat: 40 cm

Ringmaat: 6,5 mm

#### Finch's Grijskop edelparkiet ( *Psittacula himalayana finchi*) Hume 1874

Deze ondersoort met het verspreidingsgebied vanaf Nepal naar Thailand,Birma,Vietnam en Zuidwest China,heeft toch opvallende verschillen t.o.v. de nominaatvorm en is derhalve ook in deze standaard opgenomen.

De Finch's is een stuk kleiner van lichaam ,maar door een veel langere staart dan de nominaatvorm gelijk van lengte (40 cm ). Het uiteinde van de staart wordt ook niet breder en is vuilwit/bleekgeel i.p.v. geel van kleur. Ook de snavelkleur is dieper. Ook hier missen de poppen de schouderplek.

Formaat: 40 cm

Ringmaat: 6 mm

#### Pruimkop parkiet (*Psittacula cyanocephala*) Linne 1766

De Pruimkop parkiet is wel de bekendste en meest gehouden,binnen deze groep en heeft als verspreidingsgebied Sri Lanka,Rameswaram Eiland,India,Oost Pakistan en vanaf Nepal tot aan Bhutan. Er zijn geen ondersoorten van de pruimkop parkiet.

De man valt direct op met zijn "pruimrode" kopkleur,deze is bij de pop grijs. De toppen van de staart zijn bij beide geslachten wit.de pop is wat doffer van kleur en mist de zwarte neband,blauwe waas en schouderplek.

Van de pruimkop parkiet zijn er diverse mutaties opgetreden,warvan er al een aantal in deze standaard zijn opgenomen.

Formaat: 34 cm ,poppen 33 cm

Ringmaat: 5,5 mm

**Rothschild's parkiet ( *Psittacula intermedia*) Rothschild 1895**

Over het bestaan van deze soort, heeft heel wat stof doen opwaaien. Er wordt door een aantal beweerd dat het hier om een hybride zou gaan tussen de Pruimkop parkiet en Grijskop edelparkiet. Door proefparingen op te zetten van deze twee soorten is gebleken dat de Rothschild's wel degelijk een aparte soort is. De Rothschild's heeft namelijk zowel een gele boven als ondersnavel kleur en bij hybride's is de ondersnavel altijd zwart van kleur. Het verspreidingsgebied is wel overlappend van eerder genoemde soorten n.l. Noord India. De kopkleur is grijs met een paarse waas en een opvallend rood voorhoofd. Bij poppen is de rode kleur minimaal aanwezig, wel bezitten zowel man als pop een nekband. De pop mist de schoudervlek, hoewel, net als bij de roze kop en pruimkop poppen nog regelmatig een vage vlek te zien is.

Formaat: 36 cm

Ringmaat: 5.5 mm

**Fysieke standaard van de Rozekop -, Grijskopedel -, Pruimkop –en Rothschild's parkiet**

Wij verwijzen U hier naar de fysieke standaard van de Afrikaanse halsband parkiet, deze is geheel gelijk, op het formaat na. Dit kunt U terug vinden bij algemeen en bij de standaard zelf .

**Rozekop –en Grijskop edel parkieten**

| Kleurslag                           | Man: Rozekop parkiet   | Pop: Rozekop parkiet                                    | Man: Himalaya grijskop edelparkiet 40 cm  | Pop: Himalaya grijskop edelparkiet 40 cm                      | Man: Finch's grijskop edelparkiet 40 cm   | Pop: Finch's grijskop edelparkiet 40 cm  |
|-------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
| <b>Formaat:</b>                     | <b>30 cm</b>   | <b>28 cm</b>  | <b>(wildkleur)</b>  | <b>(wildkleur)</b>  | <b>(wildkleur)</b>  | <b>(wildkleur)</b>                       |
| <b>Kleur:</b>                       | <b>(wildkleur)</b>   | <b>(wildkleur)</b>                                      | <b>(wildkleur)</b>  | <b>(wildkleur)</b>  | <b>(wildkleur)</b>  | <b>(wildkleur)</b>                       |
| Kop                                 | Roze,achterkop meer lila   | Grijs,met iets lila waas Geelgroen                      | Helder donkergrijs blauwe schijn  | Donkergrijs   | Donkergrijs   | Gelijk aan man                           |
| Nek                                 | Egaal helder lichtgroen  |   | Egaal helder lichtgroen   | Egaal helder lichtgroen                                       | Groen met gele waas   |  |
| Hals en borst.<br>Buik en onderlijf | Egaal helder lichtgroen  | Egaal lichtgroen,iets matter dan bij man                | Lichtgroen  | Lichtgroen  | Groen met gele waas   | Gelijk aan man                           |
| Mantel en onderrug                  | Groen,iets bewaasd   | Gelijk aan man,iets doffer                              | Groen iets gele waas  | Groen met iets bruine waas<br>Groen                           | Donker geelgroen met bruine waas<br>Groen   | Gelijk aan man ,iets doffer              |
| Stuit                               | Helder lichtgroen  |   | Groen   |   |   |  |
| Hand - en armpennen                 | Grijszwart overgaand in diep groene toppen,buitenvlag diepgroen,binnen vlag zwartgrijs | Gelijk aan man  | Grijszwarte boven-rand, verder diep-groen, buitenvlag diepgroen, binnen-vlag zwartgrijs | Gelijk aan man ,iets donkerder                                | Donkergroen met grijszwarte toppen. Buitenvlag donkergroen ,binnenvlag zwartgrijs | Gelijk aan man                           |
| Vleugel dekveren                    | Groen iets omzoomd   | Gelijk aan man  | Groen iets omzoomd  | Groen iets bruine waas  | Groen met bruine waas   | Gelijk aan man                           |
| Middelste staartpennen              | Heldergroen overgaand in diep blauw met gele toppen                                    | Gelijk aan man,iets minder diep blauw                   | Kobaltblauw,half weg overgaand in geel (7 cm)   | Diep kobaltblauw ,halfweg overgaand in geel                   | Violet,overgaand in zachtgeel/vuilwit, de toppen weer dieper geel                 | Gelijk aan man                           |
| Overige staartpennen en             | Lichtgroen overgaand in blauwe waas met gele toppen.                                   | Gelijk aan man  | Groen ,met brede gele rand en toppen  | Diepgroen ,met brede gele rand en toppen                      | Groen met gele toppen   | Gelijk aan man                           |
| Onderstaart dekveren                | Groen  |   | Groen   | Groen   | Geelgroen   |  |
| Bovenstaart dekveren                | Helder lichtgroen  | Gelijk aan man  | Groen   | Diepgroen   | lichtgroen  | Gelijk aan man                           |
| Snavel                              | Okergeel met iets donkere punt,ondersnavel zwart                                       | Bleekgeel met iets donkere punt,ondersnavel donkergrijs | Oranjerood met gele punt,ondersnavel geel. Hoornkleurig                                 | Licht oranjerood met gele punt,ondersnavel geel. Hoornkleurig | Oranjerood met gele punt. Ondersnavel geel  | Okergeel met gele punt. Ondersnavel geel |
| Snavelrand/ neusdop                 | Bleek  | Bleek   |   |   | Hoornkleurig  | Hoornkleurig                             |
| Poten                               | Grijs  | Grijs   | Grijs   | Grijs   | Grijs   | Grijs                                    |
| Nagels                              | Grijs  | Grijs   | Grijs   | Grijs   | Grijs   | Grijs                                    |
| Ogen                                | Zwart,met bleekgele iris   | Gelijk aan man  | Zwart,met flets gele iris   | Gelijk aan man  | Zwart,met flets gele iris   | Gelijk aan man                           |
| <b>Tekening:</b>                    |  |   |   |   |   |  |
| Keel                                | Zwart  | n.v.t.  | Zwart   | Zwart   | Zwart   | Zwart                                    |
| Nekband                             | Zwart,aan kopzijde een lila rand vanaf de snavel                                       | Okergele rand   | Zwart,onderzijde een zeegroene rand   | Zwart   | Zwart,onderzijde een helder zeegroene rand  | Zwart                                    |
| Schoudervlek                        | Bruinrood  | Bruinrood   | Bruinrood   | Geen,soms vaag waarneembaar,geen heeft voorkeur.              | Bruinrood   | n.v.t.                                   |
| Slagpennen                          | Fijne bleekgele omzoming   | Fijne bleekgele omzoming                                | Fijne bleke omzoming  | Fijne bleke omzoming  | Fijne lichtgroene omzoming  | Fijne lichtgroene omzoming               |

### **Keurtechnische aanwijzingen (K.T.A.):**

#### **Rozekop parkiet:**

De rozekop parkiet komt men nog niet veelvuldig tegen op tentoonstellingen. Ze lijken erg veel op de pruimkop parkiet, met een roze i.p.v. een paarsrode kopkleur. Ze zijn ook wat kleiner van formaat, dan de pruimkop, hier moet dan ook rekening mee worden gehouden. Dit wil niet zeggen dat het model ook automatisch minder is, dit moet een volle indruk geven en ook de houding moet recht van ruglijn zijn. De kleur is helderder groen dan bij de pruimkop en de rozekop mist de zeegroene kleur in de nek, dit is heldergroen. Ook de staarttoppen zijn bij de rozekop geel, welke bij de pruimkop wit van kleur zijn. De pop is iets kleiner van formaat, mist de zwarte nekband en de kopkleur is grijs met iets lila waas. Poppen bezitten wel de bruinrode schouderplek.

Evenals bij alle edel parkieten moet er goed op de nagels gelet worden, of deze alle aanwezig zijn.

Jonge vogels hebben een groengrijze kopkleur, geen gele hals/nek zoals bij de pruimkop, een kortere staart en nog geen schouderplek. Vaak komen er na de jeugdruï al wel enkele rode veertjes hier door, maar pas na twee jaren komen ze volledig op kleur.

Tot zo ver bekend zijn er nog geen mutanten van de rozekop parkiet.

#### **Himalaya grijskop edelparkiet:**

Ook deze soort is geen alledaagse verschijning op een tentoonstelling. Ze zijn een stuk groter dan een pruimkop parkiet, door een langere staart. Man en pop bezitten beide een grijze kop en zwarte nekband, ook zijn ze gelijk van formaat. De pop is wat doffer van kleur en mist de schouderplek, indien dit iets aanwezig is moet dit bestraft worden bij kleur, toont tekening waar kleur dient te zitten. Ook is de snavelkleur wat lichter bij de pop.. Opvallend kenmerk van de nominaatvorm t.o.v. de ondersoort Finch's is dat het uiteinde van de gele staarttoppen weer wat breder worden.

Jonge vogels hebben een groene kop met wat grijs en de staart is korter.

Verder gelijk aan andere edel parkieten.

Er zijn nog geen mutaties bekend bij de himalaya grijskop edel parkiet.

#### **Finch's grijskop edelparkiet:**

Deze ondersoort van de Himalaya grijskop edelparkiet, lijkt erg veel op de nominaatvorm, maar is een stuk kleiner van lichaam, maar door een langere staart is de totale lengte precies hetzelfde. De staart van de Finch's is smaller en wordt niet breder op het uiteinde. Ook de kleur is anders bij de Finch's is de overgang van violet naar vuilwit en de toppen geel, bij de Himalaya is dit van kobalt naar geel. De algemene lichaamskleur is wat meer geelgroen en de zeegroen nek is wat lichter. Poppen zijn wat fletser/doffer van kleur en missen de schouderplek.

Jonge vogels hebben nog geen grijze kop, die krijgen ze na het eerste jaar, de staart is korter en de snavel hoornkleurig, een iets gele snavel duidt vaak op een jonge man.

Na twee jaar zijn ze volledig op kleur.

Er is 1 mutant bekend van de Finch's grijskop edelparkiet de recessief lutino, deze is nog zo zeldzaam, dat er nog geen standaard van gemaakt kan worden. Opvallend is wel dat bij deze lutino de kop lichtroze is met een witte keel en dat de gehele bovenstaart een rode waas toont op het gele topje na. Hij moet zeker ook opvallen door zijn zeer lange staart.

Verder gelijk aan andere edelparkieten.

## Pruimkop parkieten

| Kleurslag<br>Formaat:                           | Man:<br>34 cm  | Pop:<br>33 cm                                      | Man:   | Pop:                             | Man:   | Pop:                                  |
|---|--|--|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| Kleur:  | (wildkleur)  | (wildkleur)  | grijsgroen   | grijsgroen                       | cinnamon   | cinnamon                              |
| Kop   | Paars/rood, achterkop<br>meer paars                      | Grijs met blauwe waas<br>Olijfgroen, met gele waas | Diep rood, achterkop,<br>grijs bewaasd.<br>Lichtgrijsgroen | Grijs                            | Helder paars/rood,<br>achterkop met paars  | Lichtgrijs                            |
| Nek   | Turquoise  |  |  | Grijsgroen                       | Geelgroen  | Groen met bruine waas                 |
| Hals en borst                                   | Geelgroen  | Olijfgroen   | Grijsgroen   | Grijs/geelgroen                  | Diepgeelgroen  | Lichtgroen                            |
| Buik en onderlijf                               | Groen  | Groen  | Olijfgroen   | Olijf/geelgroen                  | Geelgroen  | Geelgroen                             |
| Mantel /onderrug                                | Geelgroen iets bewaasd<br>Groen                          | Olijfgroen met gele waas<br>Groen                  | Grijsgroen met grijze<br>waas<br>Grijsgroen                | Gelijk aan man, iets<br>doffer   | Geelgroen met bruine<br>waas.<br>Zeegroen  | Gelijk aan man, iets<br>doffer        |
| Stuit   |  |  |  |                                  |  |                                       |
| Hand - en armpennen                             | Donkergroen<br>naar de toppen<br>overgaand in zwartgrijs | Gelijk aan man                                     | Grijsgroen, naar de<br>toppen overgaand in<br>zwartgrijs   | Gelijk aan man                   | Groen, naar toppen<br>overgaand in bruingrijs                                      | Gelijk aan man                        |
| Vleugel dekveren                                | Diepgroen  | Gelijk aan man                                     | Grijsgroen   | Gelijk aan man                   | Bij schouders zeegroen,<br>overgaand in groen met<br>bruine waas                   | Gelijk aan man                        |
| Middelste staartpennen                          | Diep kobaltblauw, met<br>witte toppen                    | Gelijk aan man                                     | Zwartgrijs met<br>crèmekleurige toppen                     | Gelijk aan man                   | Kobaltblauw, met grijze<br>waas. Buitenzijde<br>lichter, de toppen<br>crèmekleurig | Gelijk aan man                        |
| Overige staartpennen<br>en onderstaart dekveren | Groen, met gele toppen<br>Lichtgroen                     | Gelijk aan man                                     | Grijsgroen, met gele<br>toppen<br>Geel/grijsgroen          | Gelijk aan man                   | Lichtgroen met gele<br>toppen<br>Geelgroen   | Gelijk aan man                        |
| Bovenstaart dekveren                            | Lichtgroen   | Gelijk aan man                                     | Grijsgroen   | Gelijk aan man                   | Geelgroen  | Gelijk aan man                        |
| Snavel  | Okergeel, onder<br>snavel bruinzwart                     | Bleekgeel, onder<br>snavel grijs                   | Okergeel, onder<br>snavel bruinzwart                       | Bleekgeel, onder<br>snavel grijs | Okergeel, onder<br>snavel bruin  | Bleekgeel, onder<br>snavel bruingrijs |
| Snavelrand/neusdop                              | Hoornkleurig   | Hoornkleurig                                       | Hoornkleurig   | Hoornkleurig                     | Hoornkleurig   | Hoornkleurig                          |
| Poten   | Grijs  | Grijs  | Grijs  | Grijs                            | Vleeskleurig   | Vleeskleurig                          |
| Nagels  | Grijs  | Grijs  | Grijs  | Grijs                            | Bruin  | Bruin                                 |
| Ogen  | Zwart, iris geel/wit                                     | Zwart, iris geel /wit                              | Zwart, iris geel/wit                                       | Zwart, iris geel/wit             | Donkerbruin, iris geel/wit   | Donkerbruin, iris geel/wit            |
| Tekening:                                       |  |  |  |                                  |  |                                       |
| Keel  | Zwart  | n.v.t.   | Zwart  | n.v.t.                           | Zwartbruin   | n.v.t.                                |
| Nekband   | Zwart, onderzijde licht<br>zeegroen                      | Lichtgeel  | Zwart, onderzijde<br>lichtgrijs                            | Geel                             | Zwartbruin, onder<br>zijde lichtblauw  | Geel                                  |
| Schoudervlek                                    | Roodbruin  | n.v.t.   | Roodbruin  | n.v.t.                           | Helder roodbruin   | n.v.t.                                |
| Vleugelpennen                                   | Fijne lichtgroene<br>omzoming                            | Gelijk aan man                                     | Fijne lichtgrijsgroene<br>omzoming                         | Gelijk aan man                   | Fijne geelgroene<br>omzoming   | Gelijk aan man                        |

### **KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) Pruijkop parkiet**

De pruijkop parkiet is een vrij algemene verschijning op een tentoonstelling,er moet dan ook goed op formaat en model gelet worden. Iedere en/of te smalle vogels moeten streng gestraft worden. Een goede conditie is een eerste vereiste om voor een hoge waardering in aanmerking te komen ,het missen van een of meerdere nagels is ook een veelvoorkomende fout. De kleur moet helder en egaal zijn en niet vlekkelig overkomen. Het vleugeldek is harder groen dan de borst en rugdek,waar een waas over zit. De zwarte nekband moet strak afgelijnd zijn en niet te smal/fijn. De schouderplek heeft de vorm van een driehoek en moet strak zijn. Poppen hebben een paarsgrijze kop en missen de zwarte nekband,wel bezit een pop een gele nekband,deze is vloeit iets over in de nek/rugdek. Poppen missen ook de schouderplek ,het iets tonen hiervan is een kleurfout.

Mannen zijn pas na het tweede jaar volledig op kleur. Jonge vogels hebben een grijsgroene kopkleur met een gele kraag in de nek en zijn veel doffer van kleur. Ook de staart is veel korter.

In sommige literatuur worden 3 ondersoorten genoemd, in andere worden deze als aparte soorten omschreven. Hier worden waarschijnlijk o.a. de rozekop en rothschild's mee bedoeld!  
Zie verder ook de andere edel parkieten.

### **MUTANTEN:**

#### **Pruijkop parkiet grijsgroen**

De grijsgroen wordt regelmatig foutief als olijfgroen aangeboden,een olijfgroene is een mutant met een dubbele donker factor (DD).

Dit is vrij eenvoudig te constateren de bovenzijde van de staart is bij een grijsgroene zwart en bij een DD zou dit diep blauw /mauveachtig moeten zijn. Ook is de donker factor nog niet ontstaan bij de pruijkop en is het onmogelijk om dan al een olijfgroene (DD) te kweken !

De kopkleur is dieprood,veel roder dan bij de (wildkleur) met een grijze waas in de nek,onder de zwarte nekband is de kleur grijs bewaasd.. De algemene lichaamskleur is grijsgroen,vooral rond de schouderplek is de kleur diep grijsgroen. Poppen hebben een grijze kop en zijn iets doffer van kleur. De grijsgroene is al een vrij veelvoorkomende mutant bij de kwekers,op tentoonstellingen zien we ze nog niet zo vaak.

De grijsgroen vererft autosomaal dominant.

Verder gelijk aan (wildkleur) en overige edelparkieten.

#### **Pruijkop parkiet cinnamon**

De cinnamon factor zorgt ervoor dat het originele zwart melanine ,nu uitkleur tot bruin. Ook de onderdons wordt hierdoor bruin,wat een lichtere lichaamskleur tot gevolg heeft,inclusief de kopkleur. De keel en nekband zijn zwartbruin,de nekband moet wel aan de zelfde eisen voldoen qua vorm en breedte als bij de (wildkleur),vaak zien we dat de nekband aan de smalle kant is en niet strak.

De slagpennen moeten zo diep en egaal mogelijk bruin zijn,regelmatig zien we dat deze pennen tweekleurig en te flets zijn . dit wordt bijna altijd veroorzaakt doordat de vogels in te veel zonlicht hebben gezeten waardoor deze pennen opleken. De pop heeft een lichtgrijze kopkleur en is iets doffer van kleur.

De cinnamon vererft geslachtsgebonden recessief.

Verder gelijk aan (wildkleur) en overige edelparkieten.

Van de Pruijkop parkiet zijn er ook de volgende mutaties ontstaan,deze zijn nog zo zeldzaam dat het voor een gerichte standaard omschrijving nog te vroeg is,gezien het feit dat er nog niet voldoende mannen volledig op kleur van zijn om al een gerichte omschrijving te maken. Het zelfde geldt voor de combinatie van grijsgroen met cinnamon..

Niet beschreven primaire mutanten zijn: recessief lutino, lutino (SL), blauw, overgoten, opaline, pastel of faded, recessief bont en de gele zwartoog. We zien ook regelmatig een uiterlijk turquoise, dit is echter tot nu toe steeds een modificatie gebleken, na het tweede jaar wordt het gewoon een (wildkleur).

Bij nieuwe kleurslagen vragen wij U dringend, dit te melden bij de keurmeestersvereniging parkieten en/of werkgroep edelparkieten.

#### **Rothschild's parkiet**

Over de Rothschild's parkiet zijn de meningen nogal verdeeld. Voor sommigen is dit een hybride van de pruijkop met de grijskop edelparkiet . Echter nakomelingen uit deze paring bezitten een zwarte ondersnavel en ook de bovensnavel is veel dieper oranjerood. De werkgroep edelparkieten is van mening dat het hier om een zelfstandige soort gaat

Het spreekt voor zich ,dat U wanneer ze ter keuring aangeboden worden speciaal op moet letten op de fok zuiverheid. De eerder genoemde donkere snavel bij een hybride is bij de Rothschild's geel,het rood aan de kop beperkt zich hoofdzakelijk op het voorhoofd,bij een hybride zien we deze rode kleur ook het duidelijkst op het voorhoofd,maar ook op de rest van de kop laat deze een duidelijke rode waas zien. De pop mist de vleugelplek.

Er zijn zover bekend geen mutaties opgetreden bij de Rothschild's

Verder gelijk aan overige edelparkieten.

## Malabar –en Layard's Parkiet

### Algemeen:

#### **Layard's parkiet ( *Psittacula calthorpa*) Blyth 1849**

Verspreidingsgebied Sri Lanka. De Layard's wordt ook wel Cylon parkiet genoemd de vroegere naam voor Sri Lanka.

Het is de kleinste soort binnen de *Psittacula* familie met zijn 29 cm en is erg zeldzaam binnen de vogelliefhebberij.

Er zijn geen ondersoorten bekend.

Man en pop zijn nagenoeg gelijk van kleur en tekening, poppen hebben als duidelijkste verschil een zwarte snavel i.p.v. een rode bij de man en minder groen en blauw rond het oog, ook zijn ze iets doffer van kleur

Formaat: 29 cm

Ringmaat: 6 mm

#### **Malabar parkiet (*Psittacula colomboides*) Vigors 1830**

Verspreidingsgebied Zuidwest India. De Malabar parkiet wordt ook wel Duif parkiet genoemd.

Er zijn geen ondersoorten van bekend, ondanks dat de Layard's er vrij veel van weg heeft, het grote verschil zit in het vleugeldek, dit is bij de Malabar geschubd/omzoomd en bij de Layard's zien we hier een vleugelbalk zoals we die ook zien bij de baard parkieten en Derbyan parkiet. Poppen hebben een bredere nekband en missen de zeegroene band onder de zwarte nekband. Ook de borstkleur is bij de pop grijsgroen, welke bij de man blauwgrijs is.

Formaat: 37 -38 cm

Ringmaat: 6 mm

| Kleurslag                                    | Man:<br>Layard's<br>edelparkiet                                      | Pop:<br>Layard's<br>edelparkiet                               | Man:<br>Malabar parkiet                                 | Pop:<br>Malabar parkiet                           |
|--|--|---|---|---|
| Kleur:<br>Formaat:                           | (wildkleur)<br>29 cm   | (wildkleur)<br>29 cm  | (wildkleur)<br>37 cm                                    | (wildkleur)<br>37 cm                              |
| Kop  | Grijs ,voorhoofd en rond de ogen groen                               | Gelijk aan man.alleen het groen op het voorhoofd is donkerder | Diep blauwgrijs,voorhoofd en rond het oog lichtgroen    | Grijs,minimaal groen bij het oog                  |
| Nek  | Smaragdgroen   |   |   |   |
| Hals en borst                                | Smaragdgroen   | Gelijk aan man,iets lichter                                   | Blauwgrijs  | Hals grijs,borst grijsgroen, buik lichtgrijsgroen |
| Buik ,onderlijf                              | Groen  |   | Geelgroen met blauwe waas                               |   |
| Mantel en onderrug                           | Blauwgrijs   | Gelijk aan man  | Blauwgrijs  | Grijs,minder dan bij man                          |
| Stuit  | Kobaltgrijs  |   | Zeegroen  | Zeegroen  |
| Hand - en armpennen                          | Groen met grijszwarte toppen. Buitenvlag groen,binnenvlag zwartgrijs | Gelijk aan man  | Kobaltblauw met zwartgrijze toppen                      | Gelijk aan man                                    |
| Vleugel dekveren                             | Groen,bij schouders donkergroen                                      | Donkergroen   | Donkergroen,bij schouders kobalt/mauve                  | Gelijk aan man                                    |
| Middelste staartpennen                       | Diep kobaltblauw met bleekgele punt                                  | Gelijk aan man  | Blauw met gele punt                                     | Gelijk aan man                                    |
| Overige staartpennen en onderstaart dekveren | Kobaltblauw met groene buitenvlag                                    | Gelijk aan man  | Groen,met gele punt en buitenvlag                       | Gelijk aan man                                    |
| Bovenstaart dekveren                         | Kobaltblauw met grijze waas  | Gelijk aan man  | Geel  | Gelijk aan man                                    |
| Snavel                                       | Kobaltblauw met gele punt. Ondersnavel zwart                         | Zwart   | Zeegroen  | Zwart   |
| Snavelrand/neusdop                           | Oranjerood met gele punt.  |   | Rood met iets gele punt,ondersnavel zwart met rode waas |   |
| Poten  | Hoornkleurig   | Hoornkleurig  | Hoornkleurig  | Hoornkleurig                                      |
| Nagels                                       | Lichtgrijs   | Lichtgrijs  | Lichtgrijs  | Lichtgrijs  |
| Ogen   | Grijs  | Grijs   | Zwartgrijs  | Zwartgrijs  |
|  | Zwart met flets gele iris  | Zwart met flets gele iris                                     | Zwart met gele iris                                     | Zwart met gele iris                               |
| <b>Tekening:</b>                             |  |   |   |   |
| Keel (baard)                                 | Zwart  | Zwart   | n.v.t.  | n.v.t.  |
| Voorhoofdband                                | n.v.t.   | n.v.t.  | Blauw/violet  |   |
| Nekband                                      | Zwart  | Zwart   | Zwart,onderzijde een lichtzeegroene band                | Zwart   |
| Hals   | Strak afgelijnd  | Strak afgelijnd   | Strak afgelijnd   | Strak afgelijnd                                   |
| Schoudervlek                                 | Geelgroen  | Geelgroen,iets helderder dan bij man                          | n.v.t.  | n.v.t.  |
| Vleugeldek                                   | Duidelijke lichtgroene omzoming                                      | Gelijk aan man  | Scherpe bleekgele omzoming                              | Gelijk aan man                                    |
| Vleugelpennen                                | Fijne lichtgroene omzoming   | Gelijk aan man  | Buitenvlag groen omzoomd                                | Minimale omzoming                                 |

## **KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.)**

### **Layard's parkiet**

De Layard's parkiet is nog zo zeldzaam dat we ze nog zelden op een tentoonstellingen zullen mogen aanschouwen. Hoofdzakelijk betreft het dan hier ook dan om een conditie keuring. De kleur moet wel zo diep mogelijk zijn en egaal . De nekband is vager en smaller dan bij de Malabar parkiet vooral achter in de nek. Het smaragdgroen in de nek is even diep als op de borst. De geelgroene vleugelbalk moet strak zijn afgelijnd, onder deze vleugelbalk zijn de dekveren lichtgroen omzoomd. Poppen zijn gelijk aan de man ,hebben alleen een zwarte snavel i.p.v. een rode en het vleugeldek is iets donkerder. Poppen hebben ook minder groen rond de snavel en een iets kleinere kop, is wat ronder bij man iets meer afgeplat. Jonge vogels zijn overwegend groen met een oranje snavel welke na vier maanden uitkleur naar zwartbruin. Na 1 jaar komen ze op kleur en mannen krijgen dan de rode snavel terug. Er zijn nog geen mutanten bekend. Verder gelijk aan overige edel parkieten.

### **Malabar parkiet**

De Malabar is ook nog vrij zeldzaam op een tentoonstelling, hoewel hij meer wordt gehouden, dan de Layard's.

Een goede conditie is een eerste vereiste, ook moet het model goed vol zijn en de ruglijn vanaf de nekband een rechte lijn naar de punt van de staart. De kleur van de kop is dieper blauwgrijs dan de borst en mantel, deze kleur moet wel zo egaal mogelijk zijn. In de blauwe slagpennen is iets groen op de buitenvlag zichtbaar, ook in de staart zien we groen aan de buiten zijde. De nekband is ongeveer 3 mm breed en moet strak zijn zonder uitlopers, ook de lichtzeegroene band eronder moet strak zijn afgelijnd. Om elk veertje op het vleugeldek zit een smalle geelgroene omzoming, dit moet een scherpe schubtekening vormen op het vleugeldek. De pop heeft een bredere nekband welke ook strak dient te zijn. De onderzijde hier is grijs. Het groen bij het oog is vager dan bij de man. De borstkleur moet vanaf de hals tot en met de buik egaal grijsgroen zijn. De schubtekening op de vleugels moet aan de zelfde eisen voldoen als bij de man. De pop heeft een geheel zwarte snavel.

Zover bekend zijn er nog geen mutaties .  
Verder gelijk aan overige edel parkieten.

## Langstaart parkieten en de Derbyan parkiet

### Algemeen:

Langstaart parkieten zijn de moeilijkste soorten binnen de *Psittacula* familie. Naast de nominaatvorm zijn er nog vier ondersoorten bekend. Deze ondersoorten zijn nog niet in deze standaard opgenomen, voor zover ons bekend komen ze niet in Europa voor, wel hebben we een korte omschrijving bij algemeen gedaan. Er is duidelijk geslacht's verschil bij langstaart parkieten, poppen hebben een zwarte snavel, een groene nekkleur, minder rood aan kop, een donkergroene baard tekening en de staart is veel korter.

### **Malakka langstaart parkiet (*Psittacula longicauda longicauda*) Boddaert 1783**

Verspreidingsgebied Borneo, Sumatra, Maleisie, Singapore en Malakka.

Formaat; man 42 cm pop 37 cm

Ringmaat : 6 mm

### **Niet beschreven ondersoorten:**

#### **Roodkop langstaart parkiet (*Psittacula longicauda modesta*) Fraser 1845**

Verspreidingsgebied het eiland Enggano in Indonesie.

Deze ondersoort verschilt met de nominaatvorm voornamelijk in formaat 48 cm bij man, maar de staart is wel veel korter. Vooral het lichaam zelf is veel forser. De gehele kop is diep rozerood van kleur inclusief de schedel met op het voorhoofd een groene waas en een duidelijke teugelstreep. De wangen zijn diep rood en de achterkop is roodbruin met groene waas. Poppen van deze ondersoort verschillen voornamelijk in formaat 43 cm en kopkleur, de achterkant van de kop heeft een roodbruine kleur met groene waas, verder gelijk aan nominaatvorm.

#### **Nicobar langstaart parkiet (*Psittacula longicauda nicobarica*) Gould 1857**

Verspreidingsgebied de Nicobar eilanden groep.

Het verschil met de nominaatvorm is voornamelijk de grootte, de Nicobar is 48 cm, waarbij de staart van de man de helft van de totale lengte voor zijn rekening neemt. De kop van deze ondersoort heeft diep rode wangen en een groengele achterkop en nek. De kop toont een blauwe waas. De onderrug is groenachtig van kleur. Poppen verschillen met de nominaatvorm door hun diep rood gekleurde wangen.

#### **Andamen langstaart parkiet (*Psittacula longicauda tytleri*) Hume 1874**

Deze ondersoort komt voor op de Andamen eilanden. De Andamen langstaart parkiet verschilt met de nominaatvorm voornamelijk in grootte (44 cm) en kleur rondom de kop. Het achterhoofd, de wangen en het rugdek zijn geelgroen met een grijze waas. De keel, borst en buik hebben een blauwe waas. Poppen hebben een dof oranje-rode wangtekening.

#### **Natuna langstaart parkiet (*Psittacula longicauda defontainei*) Chasen 1934**

Verspreidingsgebied Natuna, Riau, Bintan, Belitung en Karimata.

Lijkt erg veel op de nominaatvorm ook het formaat is hetzelfde (42 cm), de weinige verschillen zijn enkel dat de wangen iets dieper van kleur zijn met een oranje-rode waas en de kop is iets geler. Poppen hebben een iets dieper rode wangkleur dan de nominaatvorm.

### **Fysieke standaard: Langstaart parkieten**

Gelijk aan baard parkieten, alleen de kop en snavel zijn wat kleiner /smaller, ook steek de bovensnavel wat meer naar voren. De punt hiervan blijft ongeveer 1 cm vanaf de keel verwijderd. Het model lijkt wat smaller / ieler dit komt door de lange staart van de man. De bovenschedel is ook iets meer afgeplat.

### **Derbyan parkiet (*Psittacula derbyana*) Fraser 1852**

#### **Algemeen :**

Behoort tot de grootste soorten binnen de *Psittacula* familie, vooral zijn forse lichaam is opvallend, ook de paarse borst en buikkleur zijn specifieke kenmerken.

Het verspreidingsgebied is Zuidoost Azië, vanaf Noordoost Assam door Zuidoost Tibet tot Zuidwest China en de provincies Swechwan en Yunnan.

Er zijn geen ondersoorten, wel kunnen we stellen dat de Derbyan op de borst/buikkleur na erg veel op de baard parkieten gelijk. De poppen tonen ook de lichte streep in de nek en ook de geelgroene vleugelbalk bezitten beide soorten.

Formaat : 50 cm ,pop 48 cm

Ringmaat: 8 mm

### **Fysieke standaard: Derbyan parkiet**

Is gelijk aan fysieke standaard van de baard parkieten, alleen het model is forser inclusief de snavel.

| Kleurslag                                    | Man: Malakka langstaart parkiet                                     | Pop: Malakka langstaart parkiet                | Man: Derbyan parkiet                                  | Pop: Derbyan parkiet                           |
|--|---|--|---|--|
| <b>Kleur:</b>                                | <b>(wildkleur)</b>  | <b>(wildkleur)</b>                             | <b>(wildkleur)</b>                                    | <b>(wildkleur)</b>                             |
| <b>Formaat:</b>                              | <b>42 cm</b>  | <b>37 cm</b>                                   | <b>50 cm</b>  | <b>48 cm</b>                                   |
| Kop  | Dieproze,boven schedel donkergroen                                  | Heldergroen, iets blauwe waas op achter wangen | Grijs met paarse waas,voorhoofd meer blauw            | Kobalt/violetachtig, Voorhoofd helderder blauw |
| Nek  | Lichtgeelgroen  | Groen  | Heldergroen   | Heldergroen                                    |
| Hals en borst                                | Lichtgroen  | Diep heldergroen                               | Diep paars  | Gelijk aan man,iets doffer                     |
| Buik en onderlijf                            | Lichtgroen met gele waas  | Lichtgroen                                     | Paars,onderlijf en dijen groen                        |  |
| Mantel/rugdek                                | Lichtgeelgroen met iets blauwe waas                                 | Groen ,iets bewaasd lichtgroen                 | Donkergroen met lichte waas                           | Gelijk aan man                                 |
| Stuit  | Egaal lichtgroen  |  | Egaal groen   |  |
| Hand - en armpennen                          | Groen met zwartgrijze toppen,buitenvlag groen,binnenvlag zwartgrijs | Gelijk aan man                                 | Donkergroen,met grijszwarte toppen                    | Gelijk aan man                                 |
| Vleugel dekveren                             | Diepgroen,met geelgroene waas                                       | Gelijk aan man,iets meer bruine waas           | Donkergroen   | Gelijk aan man                                 |
| Middelste staartpennen                       | Violet  | Gelijk aan man                                 | Donkergroen, overgaand in diepblauw,toppen weer groen | Gelijk aan man                                 |
| Overige staartpennen en onderstaart dekveren | Diepblauw met groene buitenvlag Geelgroen                           | Gelijk aan man                                 | Diepgroen,onderzijde grijs. Groen                     | Gelijk aan man                                 |
| Bovenstaart dekveren                         | Lichtgroen  | Lichtgroen                                     | Groen   | Groen  |
| Snavel                                       | Rood,iets lichte punt,ondersnavel zwart                             | Zwart  | Dieprood met gele punt,ondersnavel zwart.             | Zwart  |
| Snavelrand/Neusdop                           | Hoornkleurig  | Hoornkleurig                                   | Hoornkleurig  |  |
| Poten  | Lichtgrijs  | Lichtgrijs                                     | Grijs   | Grijs  |
| Nagels                                       | Grijs   | Grijs  | Donkergrijs   | Donkergrijs                                    |
| Ogen   | Zwart met bleke iris  | Zwart met bleke iris                           | Zwart met bleke iris                                  | Zwart met bleke iris                           |
| <b>Tekening:</b>                             |   |  |   |  |
| Keel/baard                                   | Zwart   | Donkergroen                                    | Zwart   | Zwart  |
| Oogstreep/masker                             | n.v.t.  | Dieproze                                       | n.v.t.  | n.v.t.   |
| Voorhoofdsband                               | Blauwzwart  | Blauwzwart                                     | Zwart   | Zwart  |
| Halsband (pop)                               | n.v.t.  | n.v.t.   | n.v.t.  | Lichtroze                                      |
| Kop/nek                                      | Strak afgelijnd   | Strak afgelijnd                                | Strak afgelijnd                                       | Strak afgelijnd                                |
| Schoudervlek                                 | n.v.t.  | n.v.t.   | Geelgroen   | Geelgroen                                      |
| Vleugelpennen                                | Licht geelgroen omzoomd   | Gelijk aan man                                 | Bleekgele omzoming                                    | Gelijk aan man                                 |

### **KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.):**

#### **Malakka langstaart parkiet:**

Langstaart parkieten komen het best tot zijn recht als ze in een ruime TT kooi geplaatst zijn ,beter is nog een vlucht. Dit is om de staart niet te beschadigen,als ze in een TT kooi zitten waarbij de punt van de staart de bodem raakt of zijkant,dan hier een opmerking bij plaatsen dat vogel beter tot zijn recht komt in grotere kooi. Indien niet beschadigd ,niet straffen uiteraard. Een goede conditie is een eerste vereiste. De kleur moet helder en egaal zijn en geen vlekkerige indruk geven.

De baard is vrij smal en loopt door tot halfweg de kop,bij de man is het zwart en bij de pop donkergroen. Zowel de baard als de schedel moeten strak afgelijnd zijn. Poppen hebben alleen een rood masker tussen de baard en halfweg het oog en een rood vlekje achter het oog,verder is de kop heldergroen,op de donkergroene voorhoofdsband na dan.

Jonge vogels zijn donkerder groen en lijken veel op de pop het masker is wel lichter van kleur. De snavel bij jongen is zwart en jonge mannen tonen al een blauwe waas op het rugdek.

Er zijn al mutaties ontstaan,maar hier zijn nog te weinig gegevens over bekend om ze nu al in deze standaard te doen opnemen .Wat al is ontstaan zijn de waarschijnlijk donkergroen ( D factor) en de aqua of turquoise

Verder gelijk aan overige edel parkieten.

#### **Derbyan parkiet:**

De Derbyan parkiet is een robuuste forse vogel, smalle en iele vogels moeten bestraft worden bij model.

De borstkleur moet zo diep mogelijk paars zijn ,de buik is een tint lichter,bij zowel man als pop.

Verder moet de kleur zo egaal mogelijk zijn ,de mantel/rugdek is vooral bij de man wat bewaasd,de nek is helder groen.

De vleugelbalk is iets minder strak dan bij de baard parkieten,wel geniet de strakst afgelijnde de voorkeur.

Poppen hebben buiten de zwarte snavel ook een blauwere kop en een lichtroze halsband. Aan de onderzijde van de baard zien we een kleine inkeping.

Verder gelijk aan overige edel parkieten.

Er is een mutant ontstaan, waarschijnlijk een gezoomde, maar hier moeten eerst meer gegevens over zijn, om deze in de standaard te doen opnemen.