

PYRRHURA'S.

Beschrijving van de meest voorkomende
Pyrrhura soorten in Nederland.

De laatste jaren zien we steeds meer de verschillende soorten van het geslacht Pyrrhura op de tentoonstellingen. Dit is één van de redenen om voor de keurmeesters binnen de ANBvV en de liefhebbers van deze soort een beschrijving te maken van de voorkomende Pyrrhura soorten in Europa.

De opgenomen soorten zijn:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. <i>Pyrrhura cruentata</i> . | Blauwkeel parkiet |
| 2. <i>Pyrrhura frontalis frontalis</i> . | Bruinoor parkiet |
| 3. <i>Pyrrhura molinae molinae</i> | Groenwang parkiet |
| 4. <i>Pyrrhura leucotis</i> | Witoor parkiet |
| 5. <i>Pyrrhura griseipectus</i> | Grijsborst witoor parkiet |
| 6. <i>Pyrrhura pfimeri</i> | Pfimer's witoor parkiet |
| 7. <i>Pyrrhura emma</i> | Emma's witoor parkiet |
| 8. <i>Pyrrhura perlata</i> | Roodbuik parkiet |
| 9. <i>Pyrrhura lepida</i> | Pará parkiet |
| 10. <i>Pyrrhura egregia egregia</i> | Demerara parkiet |
| 11. <i>Pyrrhura melanura</i> | Zwartstaart parkiet |
| 12. <i>Pyrrhura hoffmanni hoffmanni</i> | Hoffmann's parkiet |
| 13. <i>Pyrrhura rholocephala</i> | Roodkop-roodstaart parkiet |
| 14. <i>Pyrrhura rupicola</i> | Steen parkiet |
| 15. <i>Pyrrhura picta</i> | Blauwvoorhoofd-roodstaart parkiet |
| 16. <i>Pyrrhura. roseifrons</i> | Roodschedel parkiet |

Binnen de groep Pyrrhura zou het ook de voorkeur hebben deze wetenschappelijke namen als gebruiksnaam te gaan gebruiken, sommige namen zijn echter zo ingeburgerd, dat dit wel een langere tijd zal duren, dan bij de Agaporniden het geval was. Binnen de groep Agaporniden worden de soorten aangeduid met de wetenschappelijke naam, (die algemeen bekend is bij de liefhebbers.

In het vraagprogramma van de ANBvV zijn naast de Nederlandse benamingen, tevens de wetenschappelijke namen opgenomen, zodat deze ook voor de liefhebbers bekend zijn.

Krijgt u Pyrrhura's te keuren en u bent niet zeker welke soort het precies is.

Ontleed dan de vogel aan de hand van de volgende stappen:

- 1. begin met de borst tekening, wel/niet, vorm van de borsttekening. nu heeft u al een onderverdeling in 3 verschillende groepen.*
- 2. bekijk dan de kop kleur.*
- 3. bekijk dan de staartkleur enz.*

De meeste Pyrrhura's hebben naakte oogringen, meestal wit van kleur, dit zijn dan allemaal vogels die vooral binnen gehouden worden.

Worden de vogels echter buiten gehouden, dan zal de kleur door het zonlicht snel veranderen in grijs soms zelfs na het zwart toe.

Laat U daardoor niet misleiden om te zeggen dat de vogel niet raszuiver is !!.

Hoop dat u met de beschrijving van deze soorten Pyrrhura tijdens een keuring uw voordeel kunt doen en de vogels kunt waarderen naar de getoonde kwaliteiten

Namens de Technische Commissie Parkieten van de ANBvV
Kees Bink



1.

Nederlandse benaming : **Blauwkeel parkiet**
 Wetenschappelijke naam: *Pyrrhura cruentata*. (Wied -Neuwied, 1820) (Chapman, 1914)
 Duitse benaming : Blaulatz sittich
 Engelse benaming: Blue-throated conure

Pyrrhura cruentata.

Deze soort heeft geen ondersoorten.

Beschrijving:



Het is de grootste Pyrrhura soort, het formaat varieert van 28 tot 31 cm.

De *Pyrrhura cruentata* is een overwegend groene vogel, met een grijs tot grijsbruin voorhoofd en schedel, vanaf het midden van de schedel hebben de grijsbruine veertjes goudkleurige uiteinden. Aan de zijkanten van de nek wordt het geel alsmaar intensiever waardoor er een goudgele vlek ontstaat. De oorstreek is diep bruinrood, de wangen groen.

Tussen het geel in de nek en de

groene mantel bevindt zich een duidelijke blauwe band, die aansluit op de blauwe borst/keelvlak die ook diep blauw is.

De onderrug is donkerrood, de stuitkleur groen.

De vleugel dekveren zijn groen, de vleugelbocht is rood.

De handpennen zijn groen overgaand in blauw. De slagpennen zijn diep blauw overgaand in zwart aan de uiteinden.

De olijfkleurige staart is aan de onderzijde bruinrood.

De oogring grijs, de snavel grijs/zwart, de poten grijs. De iris is opvallend geel/oranje.

Jonge vogels missen de uitgesproken felle kleuren, en hebben vaak nog bonte snavels.



2.

Nederlandse benaming :	Bruinoor parkiet
Wetenschappelijke naam:	<i>Pyrrhura frontalis frontalis</i> . (Vieillot, 1818)
Duitse benaming:	Braunohr sittich
Engelse benaming:	Maroon-bellied conure.

Pyrrhura frontalis,

Bij de *Pyrrhura frontalis* kennen we 1 ondersoort, die ook in Nederland aanwezig is. Alhoewel er meer bastaarden zijn van kruisingen tussen de nominaat vorm en van de ondersoort, zijn er nog raszuivere vogels van de ondersoort aanwezig.

De verschillen zijn voor een niet speciaallist ook zeer moeilijk waarneembaar.

We kennen de volgende ondersoorten: *Pyrrhura frontalis chiripepe*.

Beschrijving van *Pyrrhura frontalis frontalis*

Formaat van de vogel is ca 26 cm de uiterlijke kenmerken zijn een vooral groene lichaamskleur met een tint donkerder groene vleugeldekkeur.

Direct aan de washuid boven de snavel bevinden zich enkele fel-rode veertjes, de voorhoofdsband is donkerbruin-rood. De teugel is zwart.

De rest van de kop op de oorvlek na is groen, de oorvlek is bruin.

De hals en boven borst zijn olijf-bruin, iedere veer is met een mat geel omzoomd.

De onderborst, flanken en dijen zijn groen, de buik is donker roodbruin.

De stuit is groen vaak met een rode omzoming. Naarmate de vogels ouder worden breidt het rood wat meer uit. Vleugels zijn groen, de

handpennen zijn blauw/groen, de slagpennen zijn blauw met groene punten.

De staart is aan de bovenkant voor de helft olijfkleurig, vanaf het midden tot het eind van de staart rood/bruin, die naar het einde van de staart allen maar dieper van kleur wordt.

De onderzijde van de staart is mat rood/bruin

De snavel is donkergrijs/zwart, de neusdoppen lichtgrijs, de iris is donkerbruin, de oogring is vuilwit, de poten zijn grijs.

Jonge vogels: over het algemeen nog wat matter van kleur, en vaak nog op de buik nog maar weinig donkerroodbruin.

Azare parkiet *Pyrrhura frontalis chiripepe* (Vieillot, 1818)

Deze soort lijkt erg veel op de nominaat vorm, kenmerkend voor deze soort is het ontbreken van de fel/rode veertjes boven de snavel, en is de bovenzijde van de staart geheel olijfkleurig, tevens heeft deze soort een nog lichtere lichaamskleur.



3.

Nederlandse benaming :	Groenwang parkiet
Wetenschappelijke naam:	<i>Pyrrhura molinae molinae</i> (Massena & Souancé, 1854)
Duitse benaming:	Grünwangen sittich-Rotschanz sittich
Engelse benaming :	Green-cheeked conure -.Molina-conure

Bij de *Pyrrhura molinae molinae* kennen we 5 ondersoorten:

Pyrrhura molinae australis
Pyrrhura molinae flavotera
Pyrrhura molinae hypoxantha
Pyrrhura molinae phoenicura
Pyrrhura molinae restricta

Beschrijving:



Het formaat van deze vogel is ca 26 cm, de uiterlijke kenmerken van de *Pyrrhura molinae molinae* is een hoofdzakelijk groene vogel, het voorhoofd en schedel zijn donker grijs/bruin, groen doorspekt waardoor er een bruingroene kleur ontstaat.

De wangen zijn groen, aan de onderzijde blauw bewaasd, ook de nek is blauw bewaasd, de oorvlekken zijn grijs/bruin, de keel en boven borst zijn lichtbruinachtig grijs, met een mat witte tot bleek gele omzoming. Op de keel vuilwit.

De onderborst is groen en gaat op de buik in een rood/bruin over, niet strak afgetekend. De dijen, flanken en stuit zijn groen. De vleugelbocht en vleugelzoom zijn groen, de handpennen en de slagpennen zijn blauw.

De onderstaart dekveren zijn blauw/groen.

De staartveren zijn aan de bovenzijde donkerroodbruin, aan de onderzijde rood/bruin.

De snavel is donkergrijs, de neusdoppen zijn grijs, de naakte oogring is vuil wit. De iris is bruin, de poten donkergrijs.

Jonge vogels zijn wat matter van kleur en hebben vaak wat minder rood op de buik.

Argentijnse groenwang parkiet

Pyrrhura molinae australis (Todd, 1915)

Het formaat van deze soort is 26cm, er zijn exemplaren bekend tot wel 28 cm.

Kenmerkend voor deze soort is de zeer uitgebreide rode buikvlek, de onderstaart dekveren bezitten nagenoeg geen blauw, de onderborst en flanken zijn olijfgroen.

Jonge vogels zijn wat matter van kleur, maar laten al wel een behoorlijke buikvlek zien.

Geelvleugel groenwang parkiet

Pyrrhura molinae flavotera,
(Maijer, Herzog, Kessler, Friggens & Fjeldsa 1998)

In 1998 pas ontdekt, en in Nederland niet aanwezig.

Vogels als *Pyrrhura molinae molinae*, maar met een gele vleugelbocht.





Mato Grosso groenwang parkiet

Pyrrhura molinae hypoxantha (Todd, 1915)

De naam van de ondersoort P. m. hypoxantha luidde in het verleden P. m. sordida

Deze ondersoort heeft een formaat van ca 25 cm en kenmerkt zich door de kenmerkende gele borst, buik, flanken en ondervleugel dekveren, op de buik bevindt zich een ovaal vormige rood/bruine vlek. De dijen zijn geel.

Tegenwoordig zien we veel vogels met groen/gele dijen en flanken en rood/bruin tot in de borst/keel omzoming, ook zien we steeds meer vogels met rood in de ondervleugel dekveren. Dit zijn allemaal kruisingen met andere ondersoorten, vaak met de P.m. australis om er maar zoveel mogelijk rood in te kweken. Op zich zijn dit prachtige vogels maar helaas niet raszuiver.

Schegel's groenwang parkiet

Pyrrhura molinae phoenicura, (Schegel 1864)

Kenmerkend voor deze ondersoort is: de staartkleur deze is voor de helft groen aan de bovenzijde. Tevens is deze soort kleiner dan de nominaat soort: ca 24 cm.

Let op deze soort lijkt veel op een kruising tussen de Pyrrhura molinae en de Pyrrhura frontalis. Let daarom altijd op de schedel dekkleur en de kleur van de borst omzoming

Palmarito groenwang parkiet

Pyrrhura molinae restricta (Todd, 1947)

Deze ondersoort heeft een formaat van ca 24 cm, en kenmerkend voor deze soort is de bijna geheel blauwe wang, ook de flanken bevatten een blauwe waas, de onderstaartdekveren zijn bij deze soort blauw.

Tevens onderscheidt deze soort zich door een bredere omzoming op de keel en borst, waardoor de tekening bijna wegvalt.

Ook het rood/bruin op de buik is beduidend minder dan bij de nominaat vorm.

Jonge vogels zijn matter van kleur, maar hebben al wel de blauwe wangen.

4.

Nederlandse benaming :

Witoor parkiet

Wetenschappelijke naam:

Pyrrhura leucotis (Kuhl, 1820)

Duitse benaming:

Weißohr sittich

Engelse benaming :

White-eared conure

Bij de *Pyrrhura leucotis* kennen we geen ondersoorten meer de : *P. leucotis*, *P. griseipectus*, *P. pfrimeri* en *P. emma* die eerder tot de ondersoorten van de *P.leucotus* werden gerekend zijn nu eigen soorten en zullen apart beschreven worden

Beschrijving:



Het formaat is van deze vogel is ca 22 á 23 cm. De uiterlijke kenmerken van de *Pyrrhura leucotis* is een overwegend groene vogel met een donkergrijs/bruine schedel, op het voorhoofd bevindt zich een blauwe waas, soms nauwelijks zichtbaar. Rond om de nek bevindt zich een blauwe band, die op de keel bijna onzichtbaar wordt door de wit/gele omzoming.

Teugel, wangen en een smalle streep om de ogen zijn rood/bruin, de oorvlekken zijn wit. De onderborst, flanken en dijen zijn groen, op de buik bevindt zich een ovale rood/bruine vlek. De vleugelbocht is

helderrood, de handpennen groen/blauw, de slagpennen zijn blauw met zwarte punten.

De bovenzijde van de staart is groen, deze veren zijn aan de schacht echter rood van kleur,



waardoor zich een rood/groene streep aftekend die naar de punt steeds meer rood/bruin wordt. De onderzijde van de staart is mat rood/bruin. De snavel is grijs/zwart, de oogring is vuil wit, de washuid boven de snavel is grijs, poten zijn grijs, nagels donkergrijs tot zwart. de iris is bruin

Jonge vogels missen de blauwe waas op de schedel, en zijn nog wat matter van kleur.

5.

Nederlandse benaming :	Grijsborst witoor parkiet
Wetenschappelijke naam:	<i>Pyrrhura griseipectus</i> (Salvadori, 1900)
Duitse benaming:	Salvadori-Weißohr sittich
Engelse benaming :	Brazilian Grey-breasted conure

Beschrijving:



Het formaat is van deze vogel is ca 22 á 24 cm. De uiterlijke kenmerken van de *Pyrrhura griseipectus* is een overwegend groene vogel met een donkerbruine schedel, In de nek is een duidelijk blauwe waas zichtbaar overgaand naar het groen van de rugdek kleur, de keel en bovenborst veren zijn grijsbruin, met brede witte omzoming omzoomd. De omzoming heeft de vorm van halve maantjes De oorvlek is helder wit en groot. De onderborst, flanken en dijen zijn groen, op de buik bevindt zich een ovale rood/bruine

vlek. De vleugelbocht is helderrood, de handpennen groen/blauw, de slagpennen zijn blauw. De bovenzijde van de staart is aan de basis groen, geleidelijk overgaand naar rood/bruin. De onderzijde van de staart is mat rood/bruin. De snavel is grijs/zwart, de oogring is vuil wit, de washuid boven de snavel is grijs, poten zijn grijs, nagels donkergrijs tot zwart. de iris is bruin

6.

Nederlandse benaming :	Pfimer's witoor parkiet
Wetenschappelijke naam:	<i>Pyrrhura pfimeri</i> (Ribeiro, 1920)
Duitse benaming:	Pfimers sittich
Engelse benaming :	Pfimer's conure

Beschrijving:



Het formaat is van deze vogel is ca 22. De uiterlijke kenmerken van de *Pyrrhura pfimeri* is een overwegend groene vogel met een volledige blauwe schedel, op het voorhoofd bevindt zich een smalle roodbruine voorhoofdband die niet strak is in de aftekening. Rond om de nek bevindt zich een blauwe band, die op de keel vager groen/blauw word door de wit tot crème kleurig omzoming op de bovenborst.

Teugel, wangen en een smalle streep om de ogen zijn rood/bruin, de oorvlekken zijn nagenoeg verdwenen en beperken zich tot een smalle witte streep van ca 2 mm op de wang. De onderborst, flanken en dijen zijn groen, op de buik bevindt zich een ovale rood/bruine vlek. De vleugelbocht is helderrood, de handpennen groen/blauw, de slagpennen zijn blauw met zwarte punten. De bovenzijde van de staart is groen, deze veren zijn aan de schacht echter rood van kleur, waardoor zich een rood/groene streep aftekent die naar de punt steeds meer rood/bruin wordt. De onderzijde van de staart is mat rood/bruin. De snavel is grijs/zwart, de oogring is vuil wit, de washuid boven de snavel is grijs, poten zijn grijs, nagels donkergrijs tot zwart. de iris is bruin



7.

Nederlandse benaming :	Emma's witoor parkiet
Wetenschappelijke naam:	<i>Pyrrhura emma</i> (Salvadori, 1891)
Duitse benaming:	Emmas Weißohr sittich
Engelse benaming :	Emma's conure

Beschrijving:



Het formaat is van deze vogel is ca 21 cm. De uiterlijke kenmerken van de *Pyrrhura emma* is een overwegend groene vogel met een volledige blauw voorhoofd overgaand naar bruin op de achterschedel, op het voorhoofd bevindt zich een smalle roodbruine voorhoofdband die niet strak is in de aftekening. Rond om de nek bevindt zich een blauwe band, die op de keel wordt omzoomd door wit tot crème kleurige brede omzoming op de bovenborst neemt het geel toe in kleur.

Teugel, wangen en een smalle streep om de ogen zijn rood/bruin, de oorvlekken zijn lichtbruin/wit. De onderborst, flanken en dijen zijn groen, op de buik bevindt zich een ovale rood/bruine vlek. De vleugelbocht is helderrood, de handpennen groen/blauw, de slagpennen zijn blauw met zwarte punten. De stuit is rood/bruin

De bovenzijde van de staart is groen, deze veren zijn aan de schacht echter rood van kleur, waardoor zich een rood/groene streep aftekent die naar de punt steeds meer rood/bruin wordt. De onderzijde van de staart is mat rood/bruin.

De snavel is grijs/zwart, de oogring is vuil wit, de washuid boven de snavel is grijs, poten zijn grijs, nagels donkergrijs tot zwart. de iris is bruin

8.

Nederlandse benaming :	Roodbuik parkiet
Wetenschappelijke naam:	<i>Pyrrhura perlata</i> (Spix, 1824)
Duitse benaming:	Rotbauch sittich
Engelse benaming :	Crimson-bellied conure

Bij de *Pyrrhura perlata* kennen we geen ondersoorten meer, *P. lepida* die eerder tot de ondersoort van de *P.leucotus* werden gerekend is nu eigen soort en heeft als ondersoorten de: *P. l. anerythra* en *coerulescens*. Deze zullen apart beschreven worden

Beschrijving:



Het formaat is van deze vogel is ca 24 cm. De *Pyrrhura perlata* is direct te herkennen aan zijn bloedrode buik, de schedel is bruin tot zwartbruin, blauw bewaasd, de smalle voorhoofdsband is donkerroodbruin. De wangen zijn groen aan de bovenzijde aan de onderzijde blauw. De oorstreek en de omzoming van de blauwekeel en borst veren is vuilwit, bij sommige exemplaren bruin/wit, de vleugelbochten zijn helderrood, de vleugeldeken zijn groen vaak blauw doorspekt. Somige exemplaren vertonen een bijna gehele blauwe rug. Hand en slagpennen zijn blauw. De flanken en de onderstaartdekveren zijn blauw, poten en snavel donkergrijs, de naakte oogring is wit, de washuid boven de snavel is grijs/zwart.

De staart is aan de bovenzijde bruinrood aan de basis groen, de onderzijde is blauw soms met grijze waas.

Jonge vogels zijn over het algemeen veel groener op de rug en vleugels en missen het rood



op de buik, soms laten ze al enkele rode veertjes zien in het eerste levensjaar.

9.

Nederlandse benaming : **Pará parkiet**
 Wetenschappelijke naam: *Pyrrhura lepida* (Wagler, 1832)
 Duitse benaming: Blauwstei sittich
 Engelse benaming : Pearly conure

Bij de *Pyrrhura lepida* kennen we 2 ondersoorten: *Pyrrhura lepida coerulescens*,
Pyrrhura lepida anerythra

Beschrijving:



Het formaat is van deze vogel is ca 24 cm. Deze over het merendeel groene vogel heeft een bruingrijze schedel, op het voorhoofd direct boven de snavel een donkergrijsbruin bandje, op de kruin en in de nek zijn de veren parelmoer kleurig omzoomd, net als de keel en bovenborstbevedering, de veren aan de keel en bovenborst hebben een donkerblauwe basis. De wangen zijn blauw met aan de boven zijde een kleine groene vlek. De oorvlek is parelmoerwit. De buik is groen, blauw bewaasd, het meeste blauw op de onderborst. Flanken en dijen groen, evenals de vleugels en stuit. De vleugelbochten zij helderrood, de slagpennen blauw. De staart is aan de bovenzijde donkerrood/bruin aan de basis groen, de onderzijde donkergrijs. De naakte oogring is vuilwit, de poten zijn donkergrijs evenals de snavel, nagels zwart.

Jonge vogels missen vaak nog de omzoming in de nek, en het rood in de vleugelbochten, tevens zijn ze nog wat groener op de buik:

Miritiba parelparkiet *Pyrrhura lepida coerulescens*, (Neumann, 1927)
 Deze soort onderscheid zich amper van de nominaat soort. Bij deze soort is de wangvlek wat meer groen, en heeft een blauwe waas in de nek, ook is de omzoming op de borst wat smaller. Deze soort heeft blauwbewaasde onderstaartdekveren.
 Gelijk van formaat aan de *Pyrrhura lepida lepida*.

Tocatins parelparkiet *Pyrrhura lepida anerythra* (Neumann, 1927)
Pyrrhura lepida anerythra komt in Nederland niet voor.

10.

Nederlandse benaming : **Demarara parkiet**
 Wetenschappelijke naam: *Pyrrhura egregia egregia* (Sclater, 1881)
 Duitse benaming: Demerar sittich
 Engelse benaming : Fiery-shouldered conure

De *Pyrrhura egregia egregia* kent 1 ondersoort: *Pyrrhura egregia obscura*.



Beschrijving:
 Het formaat is van deze vogel is ca 25 cm.
 De *Pyrrhura egregia egregia* is een mosgroene vogel, waarbij de schedel, achterkop en nek de veren groen van kleur zijn met een grijszwarte omzoming, de bevedering rond de ogen en wangen zijn mosgroen met een vage roodbruine oorvlek, die per vogel nogal verschilt, bij sommige vogels is er helemaal geen oorvlek te onderscheiden. De veren op de keel en bovenborst en hals zijn blauwgroen, geelbruin gezoomd. Dit is een vrij smalle omzoming.



De omzoming is aan de halszijden en nek wat lichter van kleur. De onderborst en buik zijn mosgroen met in het midden een roodbruine waas. Bij oudere vogels zie je soms echt helder rode veren op de buik. De vleugelbochten zijn fel oranje naar beneden uitlopend in helder geel de handpennen en slagpennen zijn kobaltblauw. De staartveren zijn aan de bovenzijde diepdonkerrood/ bruin, de onderzijde van de staart is grijs/zwart. De poten zijn grijs, de nagels grijs/zwart

De snavel is hoornkleurig, de naakte oogring is wit, ook de washuid boven de snavel is hoornkleurig.

Jonge vogels missen de gekleurde vleugelbochten nog en de omzoming op de keel is amper waarneembaar, meestal is de kop ook nogwat lichter van kleur. Tevens is het groen ook nog wat matter van kleur.

Gran Sabana parkiet

Pyrrhura egregia obscura (Zimmer & Phelps, 1946)

Het enige verschil tussen beide soorten is de kleur groen die bij de *Pyrrhura egregia obscura* iets donkerder is. m.i. verwaarloosbaar. *Pyrrhura egregia obscura* komt in Nederland niet voor.

11.

Nederlandse benaming : **Zwartstaart parkiet**
 Wetenschappelijke naam: *Pyrrhura melanura melanura* (Spix, 1824)
 Duitse benaming: Schwarzschwanz sittich
 Engelse benaming : Maroon-tailed conure

De *Pyrrhura melanura* kent 4 ondersoorten nl:

Pyrrhura melanura berlepschi
Pyrrhura melanura chapmani
Pyrrhura melanura pacifica,
Pyrrhura melanura Souancei,

Beschrijving:



Het formaat is van deze vogel is ca 24 cm.

De *Pyrrhura melanura melanura* is een groene vogel, waarbij de schedel, achterkop donkergrijs van kleur zijn overgaand in groen in de nek met een grijs/zwarte omzoming, de bevedering rond de ogen en wangen zijn groen

De veren op de keel en bovenborst en hals zijn bruin/groen, grijs/witte omzoming.

De borst is groen met een grijze omzoming. De flankbevedering en buik zijn groen.

De vleugelbochten zijn rood naar beneden uitlopend in gele veerpunten, de handpennen en slagpennen zijn groenblauw. De

staartveren zijn aan de bovenzijde donkerrood/ bruin aan de basis groen, de onderzijde van de staart is grijs/zwart.

De poten zijn grijs, de nagels grijs/zwart

De snavel is hoornkleurig, de naakte oogring is wit, ook de washuid boven de snavel is hoornkleurig.

Op onze tentoonstellingen zullen we hooguit 2 van deze ondersoorten tegen kunnen komen, en wel de P.m.souancei en de P. m. Pacifica, daarom zullen alleen deze 2 soorten beschreven worden.

Het verschil tussen de P.m. melanura en de P.m. souancei is het volgende: Beide hebben bloedrode handpennen, waarbij die van de P.m.melanura 3 pennen een gele zoming hebben, bij de P.m. souancei zijn ze helemaal rood.



Souancé's zwartstaartparkiet*Pyrrhura melanura souancei* (Verreaux, 1858)

Het formaat is van deze vogel is ca 24 cm De lichaamskleur van de *Pyrrhura melanura Souance* is diep mosgroen, de veren op de schedel zijn groen met een brede donkergrijze omzoming, waardoor het lijkt dat deze soort een zwartgrijze kopkleur heeft.

De bevedering van de hals, nek, keel en bovenborst is groen met een witgrijze smalle omzoming. De vleugelzoom is bloedrood de handpennen zijn bloedrood. Op de buik, tussen de poten laten sommige exemplaren een donkerrode waas zien.

De staart is zwart aan de bovenzijde, en grijs/zwart aan de onderzijde.

Poten zijn grijs, nagels grijs/zwart. De naakte oogring is wit, de snavel grijs/zwart, de washuid boven de snavel is grijs.

Jonge vogels laten minder rood in de vleugels zien, en minder tekening op de hals.

Pacifische zwartstaartparkiet*Pyrrhura melanura pacifica* (Chapman, 1915)

Deze ondersoort onderscheidt zich van de voorgaande, daar deze een groen voorhoofd heeft, en de grijszwarte omzoming pas midden op de kop begint en doorloopt tot in de nek. Opvallend is bij deze soort dat de omzoming van de veren op de keel, bovenborst, hals en nek bijna geheel bruin van kleur is, slechts op de keel wat lichter van kleur.

Deze ondersoort heeft een volledig groene buik, de vleugelbocht en de handpennen zijn rood van kleur. De naakte oogring is bij deze soort grijs/wit.

Verder hetzelfde als de *Pyrrhura melanura souancei*.

ALLE VOORGAANDE SOORTEN HEBBEN EEN RONDE OMZOMING OP DE KEEL EN BOVENBORST !!

DE VOLGENDE SOORTEN HEBBEN GEEN UITGESPROKEN OMZOMING IN DE KEEL EN BORSTTEKENING. OF HELEMAAL GEEN TEKENING OP KEEL EN BORST !!

12.

Nederlandse benaming :

Hoffmann's parkiet

Wetenschappelijke naam:

Pyrrhura hoffmanni hoffmanni (Cabanis 1861)

Duitse benaming:

Hoffmanns Rotschwanz sittich

Engelse benaming :

Sulphur-winged conure

De *Pyrrhura hoffmanni hoffmanni* kent 1 ondersoorten de *Pyrrhura hoffmanni gaudens*.
Beschrijving:



Het formaat is van deze vogel is ca 24 cm. De lichaamskleur van de *Pyrrhura hoffmanni hoffmanni* is een overwegend groene vogel, de kop is geheel groen met soms een zwakke gele omzoming. De oorvlekken zijn donkerrood. Onder de ondersnavel laten sommige exemplaren een rode waas zien. De keel, borst, en buik zijn groen, soms op de borst een geelbruine waas. De vleugeldekveren zijn groen, de handpennen zijn geel uitlopend in groen de buitenste slagpennen zijn blauw. De staart bovenzijde is olijfgroen, de onderzijde bruinrood. De naakte oogring is vuilwit, de snavel hoornkleurig, poten grijs.

Opvallend is dat jonge vogels al direct volwassen lijken.

Chiriqui parkiet*Pyrrhura hoffmanni gaudens* (Bangs, 1906)

Er is maar een klein verschil met de *Pyrrhura hoffmanni hoffmanni*, en wel het rood van de oorvlek vloeit uit tot in de nek, soms is de gele omzoming op de kop meer aansprekender.

Verder gelijk aan de nominaat vorm.



13.

Nederlandse benaming :	Roodkop-roodstaart parkiet
Wetenschappelijke naam:	<i>Pyrrhura rhodocephala</i> (Scalder & Salvin 1871)
Duitse benaming:	Rotkopf sittich
Engelse benaming :	Rose-crowned conure

De *Pyrrhura rhodocephala* kent verder geen ondersoorten.
Beschrijving:



Het formaat is van deze vogel is ca 24 cm. De *Pyrrhura rhodocephala* is een overwegend groene vogel met lichtend rood voorhoofd, schedel en achterkop, in de nek overgaand in groen niet duidelijk afgetekend, vaak nog vlekkelig inde nek. Over de gehele buik en borst ligt een rode waas. De oorvlekken zijn donkerroodbruin, niet echt scherp afgetekend. De vleugels zijn groen de handpennen wit.(zeer opvallend). De slagpennen zijn blauw/violet eindigend in zwart aan de punten. De staart is aan beide zijden roodbruin. De naakte oogring is wit, de snavel hoornkleurig. De poten zijn donkergrijs, nagels zwart/grijs

Jonge vogels missen vaak nog het rood op de kop, en het wit in de vleugels. Ook het groen is wat matter van kleur.

DE VOLGENDE SOORTEN HEBBEN ALLEMAAL EEN V VORMIGE OMZOMING OP KEEL EN BOVEN BORST !!

14.

Nederlandse benaming :	Steen parkiet
Wetenschappelijke naam:	<i>Pyrrhura rupicola rupicola</i> (Tschudi 1844)
Duitse benaming:	Stein sittich
Engelse benaming :	Black-capped conure

De *Pyrrhura rupicola rupicola* kent 1 ondersoort de *Pyrrhura rupicola sandiae*.
Beschrijving:



Het formaat is van deze vogel is ca 25 cm. De *Pyrrhura rupicola rupicola* is een overwegend groene vogel met een zwartgrijze schedel in de nek niet scherp overgaand in groen. De wangen zijn olijfgroen. De bovenborst en keel bezitten een V vormige tekening die aan de binnenzijde van de veer zwart is, maar aan de buitenzijde geelwit is, in de nek meer wit, op de borst nagenoeg geel, ook is de gele omzoming van de borstveren veel breder waardoor het lijkt of deze vogels een gele borstvlek hebben. De buik en onderborst zijn groen, bij sommige exemplaren is er een donkerrode vlek waarneembaar. Dijen flanken, mantel en rug zijn groen. De vleugelbocht is groen, de handpennen dieprood, evenals

de vleugelzoom.

De slagpennen zijn groen overgaand naar blauw met zwarte uiteinden.

De bovenzijde van de staart is groen, de onderzijde grijs/zwart.

De naakte oogring is vuilwit, de poten grijs nagels zwart/grijs.

Jonge vogels als de ouders maar missen vaak nog het rood in de vleugels.





Sandia steenparkiet *Pyrrhura rupicola sandiae*
(Bond & Meyer de Schauensee, 1944)

Deze ondersoort verschilt alleen van de vorige door zijn tekeningskleur op de keel en bovenborst. Doordat de omzoming veel smaller is, blijven de kernen van de veren, die zwart zijn, beter zichtbaar. Daardoor ontstaat er een strakke tekening. Tevens bevat deze tekening veel minder geel. De wangen van deze ondersoort zijn heldergroen. De overige zaken gelijk aan de nominaatvorm.

15.

Nederlandse benaming : **Blauwvoorhoofd-roodstaartparkiet**
Wetenschappelijke naam: *Pyrrhura picta picta* (Statius Müller, 1776)
Duitse benaming: Blaustirn-Rotschwanz sittich
Engelse benaming : Painted conure

De *Pyrrhura picta picta* kent 4 ondersoorten nl.

Pyrrhura picta caeruleiceps,
Pyrrhura picta eisenmanni,
Pyrrhura picta pantchenkoi,
Pyrrhura picta subandina,

Mogelijk zijn er van ondersoorten wel enkele exemplaren in Nederland, we zullen we deze niet snel tegenkomen op onze tentoonstellingen.

Beschrijving:



Het formaat is van deze vogel is ca 22 cm. De *Pyrrhura picta picta* is een overwegend groene vogel met een bruinzwarte kop, het voorhoofd is helder blauw, het blauw loopt in een streep boven het oog weg naar achteren. De oorvlek is wit, de wangen zijn aan de bovenzijde bruin, aan de onderzijde enkele blauwe veertjes. De keel en bovenborst hebben een V vormige tekening, waarbij de kern van de veren donkergrijs is, en op de keel een witte omzoming hebben, waarbij naar de borst toe, de omzoming steeds geleer wordt. Soms is de omzoming roze/rood, wat komt, doordat de donkerrode buikvlek bijna doorloopt tot aan de borsttekening. De donkerrode buikvlek is erg variabel bij deze soort. Dijen en flanken zijn groen. De vleugels zijn groen, de vleugelbocht is helderrood, de vleugelzoom is groen, handpennen zijn blauw, evenals de grote slagpennen, waarbij het blauw uitloopt in zwart aan de uiteinde van de veer. De staart is aan de bovenzijde aan de basis groen en naar het eind donkerrood kleurt en zwartbruin eindigt. De onderzijde van de staart is donkerrood - grijs/bruin.

De snavel is grijs/zwart, de naakte oogring is grijs/wit.

De poten zijn donkergrijs, de nagels grijs/zwart.



16.

Nederlandse benaming :	Roodschedelparkiet
Wetenschappelijke naam:	<i>Pyrrhura. roseifrons roseifrons</i> (G.R. Gray 1859)
Duitse benaming:	Rotscheitel sittich
Engelse benaming :	Rose-fronted conure

De *Pyrrhura roseifrons roseifrons* kent 2 ondersoorten nl:

Pyrrhura roseifrons dilutissima
Pyrrhura roseifrons parvifrons

Beschrijving:



Het formaat is van deze vogel is ca 22 cm.

De *Pyrrhura roseifrons roseifrons* onderscheidt zich vooral door zijn rode kopkleur. Deze koptekening is zeer variabel, er zijn exemplaren die maar zeer weinig rood laten zien, terwijl andere exemplaren een volledige rode kop hebben wat uitvloeit tot in de nek en mantel. Ook de oorvlek die vuil geelwit is kan bij sommige exemplaren uitlopen tot in de zijkant van de nek. Het rood op de kop is niet egaal rood, de veertjes zijn rood met een lichtgele omzoming, waardoor het wat vlekkelig lijkt.

De borst/keel omzoming is bij deze soort ook niet uigesroken V vormig, maar zit er tussen in. Tevens is de omzoming wat smaller

waardoor het een wat donkerder aanblik geeft.

Jonge vogels missen meestal nog het rood, en hebben een bruine kop met soms hier en daar een rood veertje.

Mocht u aanvullingen hebben of onvolkomenheden tegen komen in dit document, neem contact op met de TC Parkieten zodat aanpassingen gedaan kunnen worden en er een optimaal gebruiksdokument ontstaat.

Geraadpleegde literatuur:

Alfabetisch overzicht Psittaciformis
 Soortbeschrijving Psittaciformis
 Südamerikanische Sittiche (band 4)
 Parrots of the World (second edition)
 Parrots of the World
 A guide to the parrots of the world
 Papegaaien en parkieten handboek en naslagwerk
 Encyclopedie voor de vogelliefhebber
 Vogelvreugd
 Website van kromsnaveles
 Pyrrhura info site

Harrie van de Linden
 Harrie van de Linden
 Thomas Arndt.
 Joseph Forshaw.
 Joseph Forshaw.
 Tony Juniper en Mike Parr.
 Adrie van Kooten
 A Rutgers
 A.N.B.v.V.

www.psittaciformes.nl
www.psittaciformes.nl
 ISBN 3-923269-07-2
 ISBN 0-7153-7698-5
 ISBN 978-0-691-14285-2
 ISBN 90-74345-16-6
 ISBN 978-90-5821-277-1
 LSM Gorssel
www.anbv.nl
www.kromsnaveles.com
www.pyrrhura.be

